## แนวทางในการรักษาเมื่อผู้ป่วยมีอาการแพ้ทางผิวหนัง

อาการคันไม่มีผืนหรือมีผืนแต่ ไม่มีอาการตามระบบ อาการคันมีเล็กน้อยและอาจมี อาการตามระบบ เช่น มีใช้ร่วม ด้วย

ผื่นผิวหนังรุนแรงมากที่มีรอย โรคในเยื่อบุต่างๆ ร่วมด้วย

- รับประทานยาสูตรเดิมต่อ
- อาการจะค่อยๆดีขึ้นอาจใช้ เวลาหลายสัปดาห์

หยุดยาทุกชนิด

หยุดยาทุกชนิด

ให้ Anti-Histamine (CPM,Hydroxyzine)

ให้ Anti-Histamine (CPM,Hydroxyzine) และอาจจะพิจารณาให้ Prednisolone ในขนาดต่ำๆ \*\* ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาให้ System Steroid ขนาดสูง เช่น Prednisolone 40-60 mg/day แล้วค่อยๆ ลดขนาด ยาลงตามการตอบสนองของการ รักษา

ถ้าวัณโรคอยู่ในระยะรุนแรง ให้ใช้ยากลุ่มอื่นแทนระหว่าง รอให้ผื่นแพ้หายดี (ตาราง 7)

เมื่อผื่นหายดี ให้พิจารณาเพิ่มยาใหม่ทีละตัว โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการ Re-challenge ยาวัณโรค กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยา