ตาราง 5 ตารางอันตรกิริยาระหว่างยาวัณโรคกับยาชนิดอื่นๆ และอันตรกิริยาระหว่างยาวัณโรคกับ อาหาร

ยา	ยาลดกรด	ยาที่มีส่วนประกอบ ของโลหะหนัก	เครื่องคื่มแอลกอฮอล์	อาหาร	หมายเหตุ
Н	 - ลดระดับยาใน เลือด - ลดประสิทธิภาพ ของยา 		ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเพิ่มความ เสี่ยงในการเกิดพิษ ต่อตับ	 ลดทั้งอัตราและ ปริมาณการดูดซึม ของยา ไม่ควรรับประทาน ยาพร้อมอาหาร เนื่องระดับยาใน เลือดอาจลดลง 	 ควรรับประทาน ยาก่อนอาหาร อย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลัง อาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ควรรับประทาน ในขณะท้องว่าง
R			ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเพิ่มความ เสี่ยงในการเกิดพิษ ต่อตับ	ลดทั้งอัตราและ ปริมาณการดูดขึ้ม ของยา	 ควรรับประทาน ก่อนอาหาร อย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลัง อาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ควรรับประทาน ในขณะท้องว่าง
Z	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
E	 ลดระดับยาใน เลือด ลดการดูดซึมของ ยา ไม่ควรรับ ประทานยาลด กรดก่อนและหลัง การรับประทาน ยา 2 ชั่วโมง 			¥	 หลีกเลี่ยงการให้ ยาคู่กับยาลดกรด หรือให้ยาลดกรด หลังจากรับประ- ทานยาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากมีอาการข้าง เคียงทางระบบ ทางเดินอาหาร แนะนำให้รับ ประทานยาพร้อม อาหาร
Ofx	ลดประสิทธิภาพ ของยา	ยับยั้งการดูดชีมของ ยา	*	ระดับยาสูงสุดใน เลือดลดลง 20% เมื่อรับประทาน พร้อมอาหาร	ควรรับประทานยา ก่อนหรือหลังยา ลดกรด หรือยาที่มี โลหะหนัก อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ตาราง 5 ตารางอันตรกิริยาระหว่างยาวัณโรคกับยาชนิดอื่นๆ และอันตรกิริยาระหว่างยาวัณโรคกับอาหาร(ต่อ)

ยา	ยาลดกรด	ยาที่มีส่วนประกอบ ของโลหะหนัก	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	อาหาร	หมายเหตุ
Eto	#C		ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเกิด อาการอาการข้าง เคียงทางจิต		 รับประทานยา พร้อมอาหาร ถ้ามี อาการข้างเคียง ทางระบบทางเดิน อาหารบ่อย หรือ รุนแรง เบื่ออาหาร หรือ การรับ รสเปลี่ยนแปลง รับประทานยา ก่อนนอนเพื่อ ป้องกันอาการข้าง เคียงทางระบบ ทางเดินอาหาร
Cs	*:	**	ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเกิด อาการข้างเคียง ทางระบบประสาท	อาจเพิ่มความ ต้องการ วิตามิน B12 และ folic acid	อาจรับประทานยา พร้อมอาหาร
PAS		*	•	-	หากมีอาการข้าง เคียงทางระบบทาง เดินอาหาร แนะนำ ให้รับประทานยา พร้อมอาหาร