

แนวทางการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยโรคตับ

- ก. ถ้าผู้ป่วยมีประวัติการป่วยด้วยโรคตับ แต่ผลการตรวจเลือด พบว่าสภาพการทำงานของตับปกติ สามารถให้ยาทุกชนิดได้
- ข. ถ้าผู้ป่วยมีประวัติของโรคตับและมีผลตรวจเลือดผิดปกติ กล่าวคือ
 - ถ้าค่า AST/ALT สูง แต่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าปกติให้ยา 2HRE(S)/7HR ผู้เชี่ยวชาญบางท่านแนะนำว่าถ้าเป็นผู้ป่วยสูงอายุมากๆ หรือมีปัญหาตับอื่นๆ อาจพิจารณาใช้ยา 2SHE/10-16HE เลย
 - ถ้าค่า AST/ALT สูงมากกว่า 3 เท่าของค่าปกติ ให้ยา 2SHE/16HE
- ค. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ Acute hepatitis และมี Jaundice ให้ S และ E ไปจนกว่า Jaundice จะหายไป จากนั้นให้ยา H และ R ตามปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมี Active TB และมีอาการรุนแรง อาจให้ยากลุ่ม Quinolone (เช่น Ofx) โดยเริ่มยาหลังจากให้ S และ E ไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ หรือให้ Ofx, และ E ไปพร้อมๆ กัน

แนวทางในการรักษาเมื่อผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อดั๊กเสบ

