
## แนวทางในการรักษาเมื่อผู้ป่วยมีภาวะประสาทตาอักเสบ

(optic neuritis, retrobulbar neuritis)



- มองเห็นสีผิดปกติ (dyschromatopsia, สีแดง-เขียว หรือน้ำเงิน-เหลือง)
- ตาทั
- ภาพตรงกลางดำมืด (central scotoma

มองเห็นภาพไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน มีอาการเจ็บตาเวลากลอกตานำมาก่อนในช่วงแรก ตรวจการมองเห็น (visual acuity) และภาวะตาบอดสี ตรวจไม่พบความผิดปกติ พบความผิดปกติ และไม่พบภาวะตาบอดสี หรือพบภาวะตาบอดสี ปรับขนาด E 15 มก./กก./วัน แจ้งให้ผู้ป่วยหยุดยาทันที เมื่อเกิดความผิดปกติ และไม่เกิน 20 มก./กก./วัน ในการมองเห็นและแจ้งให้แพทย์ทราบ สอบถามความผิดปกติของการมองเห็นทุกครั้ง ที่มาติดตามการรักษา ถ้ามีความผิดปกติในการมองเห็น ให้ตรวจการ มองเห็นและภาวะตาบอดสี หยุดยา ปรึกษา จักษุแพทย์

กรณีที่อาการไม่ดีขึ้นอาจเกิดจากยา H ให้

พิจารณาหยุด H ด้วย