


## แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ขาดยา (1)

\* จะใช้แผนภูมินี้ได้ในกรณีไม่มีลักษณะทางคลินิกที่แย่ลง, ภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่แย่ลงและตรวจเสมหะไม่พบเชื้อหรือพบปริมาณเชื้อที่ไม่มากขึ้น



ผู้ป่วยกลุ่มต่อไปนี้เป็นต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นหรือเพิ่มการรักษา และเฝ้าระวังติดตามการขาดนัด

- ผู้ป่วยมีผลเสมหะเป็นพบเชื้อ (ย้อม AFB หรือ culture) เมื่อกลับมารักษาซ้ำหลังจากขาดยาติดต่อกันเกิน 2 เดือน
- ขาดยาในระยะเข้มข้นของการรักษา
- ขาดยาในช่วงต้นของระยะต่อเนื่องของการรักษา
- ขาดยาเป็นระยะเวลานาน
- ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น ติดเชื้อเอชไอวีหรือภาวะอื่นๆ ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง)
- ผู้ป่วยตอบสนองไม่ดีต่อการรักษา ก่อนขาดยา
- รู้หรือสงสัยว่าเป็นวัณโรคดื้อยา