



Calcolo differenziale — Scheda di esercizi n. 7
11 Dicembre 2023 — Compito n. 00009

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella “**C**” serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data. Per selezionare una casella, annerirla completamente: ☐ (non ☐ o ☐).

Nome: _____

Cognome: _____

Matricola:

--	--	--	--	--	--	--

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false

1A)

$$x^8 = o(x^8).$$

1B)

$$\sin^2(x-4) = o((x-4)^2).$$

1C)

$$3x^4 + 9x^3 = o(x^3).$$

1D)

$$[e^{x-4} - 1]^3 = o((x-4)^3).$$

2) Sia

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 4.$$

2A)

$$T_1(f(x); 0) = -5x + 4.$$

2B)

$$T_2(f(x); 0) = 3x^2 - 5x + 4.$$

2C)

$$T_1(f(x); 3) = 13x + 16.$$

2D)

$$T_3(f(x); 2) \neq T_2(f(x); 2).$$

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false

3A)

$$T_2(e^{8x}; 0) = 1 + 8x + 32x^2.$$

3B)

$$T_3(x \sin(5x); 0) = 25x^2.$$

3C)

$$T_2\left(\frac{\sin(3x)}{x}; 0\right) = 3 - \frac{3}{2}x^2.$$

3D)

$$T_2\left(\frac{x}{1+7x}; 0\right) = x + 7x^2.$$

4) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false

4A)

$$\cos(2x^2) = 1 - 8x^4 + o(x^4).$$

4B)

$$x(e^{3x} - 5) = -4x + o(x).$$

4C)

$$\frac{\sin(4x^2)}{x^2} = 16 + o(x^4).$$

4D)

$$\frac{\log(1+3x^2)}{x} = 3x + o(x^3).$$

Docente

- ☐ Garroni [A, F]
☐ Orsina [G, Z]

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00009

5) Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in $x_0 = 0$ delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = e^{6x^2}$,

b) $g(x) = x(\cos(10x) - 1)$,

c) $h(x) = \frac{1}{1 - 2x^2}$,

d) $k(x) = x^2(e^{10x} - \sin(10x))$,

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00009

6) Calcolare, usando Taylor, i seguenti limiti:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) - 2x}{4x^3},$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (e^{6x^2} - 1)}{1 - \cos(6x^2)},$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(4x) - 4x)^2}{64x^6},$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{5x} - 1) \sin(2x)}{\log(1 + 10x^2)}.$

Soluzioni del compito 00009

1) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false

1A)

$$x^8 = o(x^8).$$

Falso: Dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^8}{x^8} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \neq 0,$$

non è vero che $x^8 = o(x^8)$. Dividendo per x^7 , si vede facilmente che $x^8 = o(x^7)$.

1B)

$$\sin^2(x-4) = o((x-4)^2).$$

Falso: Dato che, con la sostituzione $y = x - 4$ si ha

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sin^2(x-4)}{(x-4)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin^2(y)}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(y)}{y} \right)^2 = 1^2 = 1 \neq 0,$$

non è vero che $\sin^2(x-4) = o((x-4)^2)$. Dividendo per $x-4$, si vede facilmente che $\sin^2(x-4) = o(x-4)$.

1C)

$$3x^4 + 9x^3 = o(x^3).$$

Falso: Dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^4 + 9x^3}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} [3x + 9] = 9 \neq 0,$$

non è vero che $3x^4 + 9x^3 = o(x^3)$. Dividendo per x^2 , si vede facilmente che $3x^4 + 9x^3 = o(x^2)$.

1D)

$$[e^{x-4} - 1]^3 = o((x-4)^3).$$

Falso: Dato che si ha, con la sostituzione $y = x - 4$,

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{[e^{x-4} - 1]^3}{(x-4)^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{[e^y - 1]^3}{y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{e^y - 1}{y} \right)^3 = 1^3 = 1 \neq 0,$$

non è vero che $[e^{x-4} - 1]^3 = o((x-4)^3)$. Dividendo per $(x-4)^2$, si vede facilmente che $[e^{x-4} - 1]^3 = o((x-4)^2)$.

2) Sia

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 4.$$

2A)

$$T_1(f(x); 0) = -5x + 4.$$

Vero: Si ha $f(0) = 4$; inoltre, dato che $f'(x) = 6x - 5$, si ha $f'(0) = -5$. Pertanto,

$$T_1(f(x); 0) = f(0) + f'(0)x = -5x + 4.$$

Analogamente, dato che

$$f(x) = 4 - 5x + 3x^2 = -5x + 4 + o(x),$$

si ha $T_1(f(x); 0) = -5x + 4$.

2B)

$$T_2(f(x); 0) = 3x^2 - 5x + 4.$$

Vero: Ci sono due modi per rispondere a questa domanda: calcolare $f(0)$, $f'(0)$ e $f''(0)$ e scrivere il polinomio di Taylor usando la formula, oppure ricordare che il polinomio di Taylor di ordine n di un polinomio di grado n è il polinomio stesso.

Seguendo la prima strada, dato che $f(0) = 4$, che $f'(0) = -5$ e che $f''(0) = 6$ dato che $f''(x) = 6$ per ogni x , si ha

$$T_2(f(x); 0) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = 3x^2 - 5x + 4 = f(x),$$

che è lo stesso risultato che si ottiene con il secondo metodo.

2C)

$$T_1(f(x); 3) = 13x + 16.$$

Falso: Dato che $f(3) = 16$ e che $f'(3) = 13$ essendo $f'(x) = 6x - 5$ per ogni x , si ha

$$T_1(f(x); 3) = f(3) + f'(3)(x - 3) = 13(x - 3) + 16 \neq 13x + 16.$$

2D)

$$T_3(f(x); 2) \neq T_2(f(x); 2).$$

Falso: Dato che la derivata terza di un polinomio di grado 2 è identicamente nulla (così come le derivate successive), si ha

$$T_3(f(x); 2) = T_2(f(x); 2) + \frac{f^{(3)}(2)}{6}x^3 = T_2(f(x); 2).$$

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false

3A)

$$T_2(e^{8x}; 0) = 1 + 8x + 32x^2.$$

Vero: Ricordando che

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

si ha, con la sostituzione $t = 8x$,

$$e^{8x} = 1 + 8x + \frac{(8x)^2}{2} + o(x^2) = 1 + 8x + 32x^2 + o(x^2),$$

da cui segue che

$$T_2(e^{8x}; 0) = 1 + 8x + 32x^2.$$

3B)

$$T_3(x \sin(5x); 0) = 25x^2.$$

Falso: Ricordando che

$$\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

si ha, con la sostituzione $t = 5x$,

$$\sin(5x) = 5x - \frac{(5x)^3}{6} + o(x^3),$$

da cui segue che

$$x \sin(5x) = x \left(5x - \frac{(5x)^3}{6} + o(x^3) \right) = 5x^2 - \frac{5^3}{6}x^4 + o(x^4) = 5x^2 + o(x^3).$$

Pertanto,

$$T_3(x \sin(5x); 0) = 5x^2 \neq 25x^2.$$

3C)

$$T_2\left(\frac{\sin(3x)}{x}; 0\right) = 3 - \frac{3}{2}x^2.$$

Falso: Ricordando che

$$\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

si ha, con la sostituzione $t = 3x$,

$$\sin(3x) = 3x - \frac{(3x)^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^3),$$

da cui segue che

$$\frac{\sin(3x)}{x} = \frac{3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^3)}{x} = 3 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).$$

Si ha pertanto

$$T_2\left(\frac{\sin(3x)}{x}; 0\right) = 3 - \frac{9}{2}x^2 \neq 3 - \frac{3}{2}x^2.$$

3D)

$$T_2\left(\frac{x}{1+7x}; 0\right) = x + 7x^2.$$

Falso: Ricordando che

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + o(t),$$

si ha, con la sostituzione $t = -7x$,

$$\frac{1}{1+7x} = 1 - 7x + o(x),$$

da cui segue che

$$\frac{x}{1+7x} = x(1 - 7x + o(x)) = x - 7x^2 + o(x^2).$$

Pertanto,

$$T_2\left(\frac{x}{1+7x}; 0\right) = x - 7x^2 \neq x + 7x^2.$$

4) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false

4A)

$$\cos(2x^2) = 1 - 8x^4 + o(x^4).$$

Falso: Ricordando che

$$\cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

si ha, con la sostituzione $t = 2x^2$,

$$\cos(2x^2) = 1 - \frac{(2x^2)^2}{2} + o((x^2)^2) = 1 - 2x^4 + o(x^4) \neq 1 - 8x^4 + o(x^4).$$

4B)

$$x(e^{3x} - 5) = -4x + o(x).$$

Vero: Ricordando che

$$e^t = 1 + t + o(t),$$

si ha, con la sostituzione $t = 3x$,

$$e^{3x} = 1 + 3x + o(x),$$

da cui segue che

$$x(e^{3x} - 5) = x(1 + 3x + o(x) - 5) = -4x + 3x^2 + o(x^2) = -4x + o(x).$$

4C)

$$\frac{\sin(4x^2)}{x^2} = 16 + o(x^4).$$

Falso: Ricordando che

$$\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

si ha, con la sostituzione $t = 4x^2$,

$$\sin(4x^2) = 4x^2 - \frac{(4x^2)^3}{6} + o((x^2)^3) = 4x^2 - \frac{4^3}{6}x^6 + o(x^6) = 4x^2 + o(x^5).$$

Pertanto,

$$\frac{\sin(4x^2)}{x^2} = \frac{4x^2 + o(x^5)}{x^2} = 4 + o(x^3) \neq 16 + o(x^4).$$

4D)

$$\frac{\log(1 + 3x^2)}{x} = 3x + o(x^3).$$

Falso: Ricordando che

$$\log(1 + t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

si ha, con la sostituzione $t = 3x^2$,

$$\log(1 + 3x^2) = 3x^2 - \frac{(3x^2)^2}{2} + o((x^2)^2) = 3x^2 - \frac{9}{2}x^4 + o(x^4).$$

Pertanto,

$$\frac{\log(1 + 3x^2)}{x} = \frac{3x^2 - \frac{9}{2}x^4 + o(x^4)}{x} = 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^3) \neq 3x + o(x^3).$$

5) Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in $x_0 = 0$ delle seguenti funzioni:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} f(x) = e^{6x^2}, & \text{b)} g(x) = x(\cos(10x) - 1), \\ \text{c)} } h(x) = \frac{1}{1-2x^2}, & \text{d)} k(x) = x^2(e^{10x} - \sin(10x)), \end{array}$$

Soluzione:

a) Ricordando che

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

si ha, con la sostituzione $t = 6x^2$,

$$e^{6x^2} = 1 + 6x^2 + \frac{(6x^2)^2}{2} + o((x^2)^2) = 1 + 6x^2 + 18x^4 + o(x^4),$$

da cui segue che

$$T_4(f(x); 0) = 1 + 6x^2 + 18x^4 + o(x^4).$$

b) Ricordando che

$$\cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + o(t^4) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^3),$$

si ha, con la sostituzione $t = 10x$,

$$\cos(10x) = 1 - \frac{(10x)^2}{2} + o(x^3) = 1 - 50x^2 + o(x^3),$$

da cui segue che

$$x(\cos(10x) - 1) = x(1 - 50x^2 + o(x^3) - 1) = -50x^3 + o(x^4).$$

Pertanto,

$$T_4(g(x); 0) = -50x^3.$$

c) Ricordando che

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + o(t^2),$$

si ha, con la sostituzione $t = 2x^2$,

$$\frac{1}{1-2x^2} = 1 + 2x^2 + (2x^2)^2 + o((x^2)^2) = 1 + 2x^2 + 4x^4 + o(x^4).$$

Pertanto,

$$T_4(h(x); 0) = 1 + 2x^2 + 4x^4.$$

d) Ricordando che

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2), \quad \sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

si ha, con la sostituzione $t = 10x$,

$$e^{10x} = 1 + 10x + \frac{(10x)^2}{2} + o(x^2), \quad \sin(10x) = 10x - \frac{(10x)^3}{6} + o(x^3) = 10x + o(x^2).$$

Pertanto,

$$e^{10x} - \sin(10x) = 1 + 10x + 50x^2 + o(x^2) - 10x + o(x^2) = 1 + 50x^2 + o(x^2),$$

da cui segue che

$$x^2(e^{10x} - \sin(10x)) = x^2(1 + 50x^2 + o(x^2)) = x^2 + 50x^4 + o(x^4).$$

In definitiva,

$$T_4(k(x); 0) = x^2 + 50x^4.$$

6) Calcolare, usando Taylor, i seguenti limiti:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) - 2x}{4x^3}, & \text{b)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(e^{6x^2} - 1)}{1 - \cos(6x^2)}, \\ \text{c)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(4x) - 4x)^2}{64x^6}, & \text{d)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{5x} - 1)\sin(2x)}{\log(1 + 10x^2)}. \end{array}$$

Soluzione:

a) Ricordando che

$$\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

si ha, con la sostituzione $t = 2x$,

$$\sin(2x) = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3),$$

da cui segue che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) - 2x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{2^3}{6}x^3 + o(x^3) - 2x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2^3}{6}x^3 + o(x^3)}{2^2x^3}.$$

Semplificando, si ha quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) - 2x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{3} + \frac{o(x^3)}{x^3} \right] = -\frac{1}{3} + 0 = -\frac{1}{3}.$$

b) Ricordando che

$$e^t = 1 + t + o(t), \quad \cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

si ha, con la sostituzione $t = 6x^2$,

$$e^{6x^2} = 1 + 6x^2 + o(x^2), \quad \cos(6x^2) = 1 - \frac{(6x^2)^2}{2} + o((x^2)^2) = 1 - 18x^4 + o(x^4).$$

Pertanto,

$$x^2(e^{6x^2} - 1) = x^2(1 + 6x^2 + o(x^2) - 1) = 6x^4 + o(x^4),$$

e

$$1 - \cos(6x^2) = 1 - (1 - 18x^4 + o(x^4)) = 18x^4 + o(x^4).$$

Pertanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(e^{6x^2} - 1)}{1 - \cos(6x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^4 + o(x^4)}{18x^4 + o(x^4)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} \frac{6 + \frac{o(x^4)}{x^4}}{18 + \frac{o(x^4)}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + \frac{o(x^4)}{x^4}}{18 + \frac{o(x^4)}{x^4}} = \frac{6 + 0}{18 + 0} = \frac{1}{3}.$$

c) Ricordando che

$$\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

si ha, con la sostituzione $t = 4x$,

$$\sin(4x) = 4x - \frac{(4x)^3}{6} + o(x^3) = 4x - \frac{32}{3}x^3 + o(x^3).$$

Si ha quindi

$$\sin(4x) - 4x = 4x - \frac{32}{3}x^3 + o(x^3) - 4x = -\frac{32}{3}x^3 + o(x^3).$$

Elevando al quadrato, si ha

$$(\sin(4x) - 4x)^2 = \left(-\frac{32}{3}x^3 + o(x^3)\right)^2 = \left(\frac{32}{3}\right)^2 x^6 - 2\frac{32}{3}x^3 o(x^3) + o(x^6) = \left(\frac{32}{3}\right)^2 x^6 + o(x^6).$$

Pertanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(4x) - 4x)^2}{64x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{32}{3}\right)^2 x^6 + o(x^6)}{64x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{16}{9} + \frac{o(x^6)}{x^6} \right] = \frac{16}{9} + 0 = \frac{16}{9}.$$

d) Ricordando che

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2), \quad \sin(s) = s - \frac{s^3}{6} + o(s^3),$$

si ha, con le sostituzioni $t = 5x$ e $s = 2x$,

$$e^{5x} = 1 + 5x + \frac{(5x)^2}{2} + o(x^2) = 1 + 5x + o(x),$$

e

$$\sin(2x) = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3) = 2x + o(x^2).$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} (e^{5x} - 1) \sin(2x) &= (1 + 5x + o(x) - 1)(2x + o(x^2)) \\ &= (5x + o(x))(2x + o(x^2)) \\ (1) \quad &= 10x^2 + 5x o(x^2) + 2x o(x) + o(x) o(x^2) \\ &= 10x^2 + o(x^3) + o(x^2) + o(x^3) \\ &= 10x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

Ricordando poi che

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

si ha, con la sostituzione $t = 10x^2$,

$$(2) \quad \log(1 + 10x^2) = 10x^2 - \frac{(10x^2)^2}{2} + o((x^2)^2) = 10x^2 + o(x^2).$$

Da (1) e (2) segue allora che

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{5x} - 1) \sin(2x)}{\log(1 + 10x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10x^2 + o(x^2)}{10x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} \frac{10 + \frac{o(x^2)}{x^2}}{10 + \frac{o(x^2)}{x^2}},$$

e, semplificando,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{5x} - 1) \sin(2x)}{\log(1 + 10x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10 + \frac{o(x^2)}{x^2}}{10 + \frac{o(x^2)}{x^2}} = \frac{10 + 0}{10 + 0} = 1.$$

Osservazione: nella formula (3) compare la frazione

$$\frac{10x^2 + o(x^2)}{10x^2 + o(x^2)};$$

osserviamo che la frazione **tende** a 1, ma non è **uguale** a 1, dato che non conosciamo quanto valgono le quantità $o(x^2)$ al numeratore e al denominatore.