



Calcolo differenziale — Scheda di esercizi n. 2
9 Ottobre 2023 — Compito n. 00005

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella “**C**” serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data. Per selezionare una casella, annerirla completamente: ☐ (non ☐ o ☐).

Nome: _____

Cognome: _____

Matricola:

--	--	--	--	--	--	--

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 12x + 32}.$$

- 1A) L'insieme E è un intervallo.
1B) L'insieme E non è limitato.
1C) L'insieme E non contiene l'insieme $[6, +\infty)$.
1D) La funzione $f(x)$ è pari.

2) Sai E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \log_7(|x - 6| - 1).$$

- 2A) L'insieme E non è un intervallo.
2B) L'insieme E è limitato.
2C) Il valore $x = 7$ non appartiene ad E .
2D) La funzione $f(x)$ è dispari.

3) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \frac{\sin(11x)}{\cos(x)}.$$

- 3A) L'insieme E è un intervallo.
3B) L'insieme E non è limitato.
3C) La funzione $f(x)$ non è periodica.
3D) La funzione $f(x)$ è pari.

4) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \left| \frac{x+4}{x-4} \right|.$$

- 4A) L'insieme E non è un intervallo.
4B) L'insieme $E \cap (7, 10)$ non è un intervallo.
4C) La funzione $f(x)$ è pari.
4D) La funzione $f(x)$ non è limitata.

Docente

- ☐ Garroni [A, F]
☐ Orsina [G, Z]

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00005

5) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

a) $f(x) = \sqrt{(x-2)(x-4)(x-6)}$, **b)** $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2} + \sqrt{x-4}}$,

c) $h(x) = \log_7(-x^2 + 9x - 18)$, **d)** $k(x) = \sqrt[8]{\cos(9x) - \frac{1}{2}}$.

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00005

6) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

a) $f(x) = \frac{\sin(2x)}{\operatorname{tg}(x) - 1}$, b) $g(x) = \sqrt{6\sqrt{x-5} - 36}$,

c) $h(x) = \sqrt{x-3} + \sqrt{9-x^2}$, d) $k(x) = \sqrt{\log_4(x-9) - 2}$.

Soluzioni del compito 00005

1) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 12x + 32}.$$

La funzione $f(x)$ è definita se e solo se l'argomento della radice è positivo:

$$E = \{ x \in \mathbb{R} : x^2 - 12x + 32 \geq 0 \}.$$

Risolvendo l'equazione $x^2 - 12x + 32 = 0$ si trova $x = 4$ e $x = 8$; dovendo risolvere la disuguaglianza con il maggiore o uguale, si ha

$$x^2 - 12x + 32 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \leq 4 \quad \text{oppure} \quad x \geq 8.$$

Si ha pertanto che

$$(1) \quad E = (-\infty, 4] \cup [8, +\infty).$$

1A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Per la (1), E non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

1B) L'insieme E non è limitato.

Vero: Dalla (1) si ha che E è illimitato, sia superiormente che inferiormente.

1C) L'insieme E non contiene l'insieme $[6, +\infty)$.

Vero: Per la (1), l'insieme $[6, 8)$ non è contenuto in E , e quindi l'insieme $[6, +\infty)$ non è contenuto in E .

1D) La funzione $f(x)$ è pari.

Falso: Se la funzione $f(x)$ fosse pari (o fosse dispari), il suo insieme di definizione E sarebbe simmetrico rispetto all'origine. Dato che per la (1) l'insieme di definizione di $f(x)$ non è simmetrico rispetto all'origine, la funzione $f(x)$ non è né pari, né dispari.

Alternativamente, la funzione è definita per $x = -6$, ma non lo è per $-x = 6$ e quindi, per tale valore di x , non ha senso chiedersi se si abbia $f(-x) = f(x)$, ovvero $f(-x) = -f(x)$.

2) Sai E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \log_7(|x - 6| - 1).$$

La funzione $f(x)$ è definita se e solo se il suo argomento è positivo, e quindi

$$E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 6| - 1 > 0\}.$$

Risolvendo la disequazione, si ha

$$|x - 6| - 1 > 0 \iff |x - 6| > 1 \iff x - 6 > 1 \text{ oppure } x - 6 < -1.$$

Pertanto x appartiene ad E se e solo se $x > 7$, ovvero $x < 5$. Si ha quindi

$$(1) \quad E = (-\infty, 5) \cup (7, +\infty).$$

2A) L'insieme E non è un intervallo.

Vero: Dalla (1) segue che E non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

2B) L'insieme E è limitato.

Falso: Dalla (1) segue che l'insieme E è illimitato, sia superiormente che inferiormente.

2C) Il valore $x = 7$ non appartiene ad E .

Vero: Dalla (1) segue che $x = 7$ non appartiene ad E .

2D) La funzione $f(x)$ è dispari.

Falso: Se la funzione $f(x)$ fosse pari (o fosse dispari), il suo insieme di definizione E sarebbe simmetrico rispetto all'origine. Dato che per la (1) l'insieme di definizione di $f(x)$ non è simmetrico rispetto all'origine, la funzione $f(x)$ non è né pari, né dispari.

Alternativamente, la funzione è definita per $x = -6$, ma non lo è per $-x = 6$ e quindi, per tale valore di x , non ha senso chiedersi se si abbia $f(-x) = f(x)$, ovvero $f(-x) = -f(x)$.

3) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \frac{\sin(11x)}{\cos(x)}.$$

Il denominatore della frazione che definisce $f(x)$ si annulla per $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, con k in \mathbb{Z} . Per tali valori, si ha

$$11 \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right) = \frac{11\pi}{2} + 11k\pi.$$

Per tutti questi valori (un multiplo dispari di $\frac{\pi}{2}$ più un multiplo intero di π) la funzione $\sin(y)$ vale 1 o -1 . Pertanto, se si annulla il denominatore della frazione, il numeratore non si annulla, e quindi l'insieme di definizione di $f(x)$ coincide con l'insieme dei numeri reali tali che $\cos(x) \neq 0$. Si ha quindi

$$(1) \quad E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

3A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Dalla (1) segue che E non è un intervallo: è pieno di buchi...

3B) L'insieme E non è limitato.

Vero: Dalla (1) segue che l'insieme E non è limitato, essendo illimitato sia superiormente che inferiormente.

3C) La funzione $f(x)$ non è periodica.

Falso: Si ha, ricordando che seno e coseno sono periodiche di periodo 2π , e se x è tale che $f(x)$ è definita (esercizio: per tali valori è definita anche $f(x + 2\pi)$)

$$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(11(x + 2\pi))}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(11x + 22\pi)}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(11x)}{\cos(x)} = f(x),$$

e quindi la funzione $f(x)$ è periodica di periodo 2π .

3D) La funzione $f(x)$ è pari.

Falso: Si ha, ricordando che la funzione seno è dispari, che la funzione coseno è pari, e se x è tale che $f(x)$ è definita (esercizio: per tali valori è definita anche $f(-x)$),

$$f(-x) = \frac{\sin(-11x)}{\cos(-x)} = -\frac{\sin(11x)}{\cos(x)} = -f(x),$$

e quindi la funzione $f(x)$ è dispari.

4) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \left| \frac{x+4}{x-4} \right|.$$

La funzione $f(x)$ è definita se e solo se il denominatore della frazione all'interno del modulo non si annulla, ovvero se e solo se $x - 4 \neq 0$. Si ha pertanto

(1)
$$E = (-\infty, 4) \cup (4, +\infty).$$

Esercizio: dimostrare che

$$f(-x) = \frac{1}{f(x)}, \quad \text{per ogni } x \neq \pm 4.$$

4A) L'insieme E non è un intervallo.

Vero: Per la (1), l'insieme E non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

4B) L'insieme $E \cap (7, 10)$ non è un intervallo.

Falso:

4C) La funzione $f(x)$ è pari.

Falso: Si ha

$$f(5) = \left| \frac{5+4}{5-4} \right| = 9,$$

e

$$f(-5) = \left| \frac{-5+4}{-5-4} \right| = \frac{1}{9}.$$

Dato che $f(-5) \neq \pm f(5)$, la funzione non è né pari né dispari.

4D) La funzione $f(x)$ non è limitata.

Vero: Calcoliamo $f(4 + \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$. Si ha

$$f(4 + \varepsilon) = \left| \frac{4 + 4 + \varepsilon}{4 + \varepsilon - 4} \right| = \frac{8 + \varepsilon}{\varepsilon} = \frac{8}{\varepsilon} + 1.$$

Scegliendo $\varepsilon = \frac{1}{n}$, con n in \mathbb{N} , si ha

$$f(4 + 1/n) = 8n + 1,$$

che diventa arbitrariamente grande quando n diventa grande. Ne segue che l'insieme dei valori assunti da $f(x)$ è illimitato superiormente, e quindi che la funzione non è limitata.

5) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

$$\text{a) } f(x) = \sqrt{(x-2)(x-4)(x-6)}, \quad \text{b) } g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2} + \sqrt{x-4}},$$

$$\text{c) } h(x) = \log_7(-x^2 + 9x - 18), \quad \text{d) } k(x) = \sqrt[8]{\cos(9x) - \frac{1}{2}}.$$

Soluzione:

a) La funzione è definita se e solo se l'argomento della radice è maggiore o uguale a zero. Si tratta quindi di risolvere la disequazione

$$(x-2)(x-4)(x-6) \geq 0.$$

Studiamo il segno dei tre termini separatamente:

$$x-2 \geq 0 \iff x \geq 2, \quad x-4 \geq 0 \iff x \geq 4, \quad x-6 \geq 0 \iff x \geq 6,$$

il che porta al seguente schema:

	2	4	6
$x \geq 2$	-	+	+
$x \geq 4$	-	-	+
$x \geq 6$	-	-	+
segno	-	+	-

Si ha quindi $(x-2)(x-4)(x-6) \geq 0$ se e solo se $2 \leq x \leq 4$ ovvero se $x \geq 6$. Ne segue che l'insieme di definizione di $f(x)$ è l'insieme

$$F = [2, 4] \cup [6, +\infty),$$

che non è un intervallo.

b) La funzione $g(x)$ è definita se e solo se gli argomenti delle radici sono positivi, e il denominatore è diverso da zero:

$$x-2 \geq 0, \quad x-4 \geq 0, \quad \sqrt{x-2} + \sqrt{x-4} \neq 0.$$

Risolvendo le prime due disequazioni, abbiamo che deve essere $x \geq 2$ e $x \geq 4$; ovvero, che deve essere $x \geq 4$. Osserviamo ora che se $x \geq 4$ si ha

$$\sqrt{x-2} + \sqrt{x-4} \geq \sqrt{2} + \sqrt{4-4} = \sqrt{2} > 0.$$

In definitiva, se le due radici quadrate sono definite, la loro somma non si annulla mai. Si ha pertanto che l'insieme di definizione di $g(x)$ è

$$G = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 4\} = [4, +\infty),$$

che è un intervallo (illimitato superiormente).

c) La funzione $h(x)$ è definita se e solo se l'argomento del logaritmo è positivo, ovvero se e solo se

$$-x^2 + 9x - 18 > 0 \iff x^2 - 9x + 18 < 0.$$

Risolvendo l'equazione $x^2 - 9x + 18 = 0$ si trova $x = 3$ oppure $x = 6$. Dato che ci interessano i valori in cui il polinomio è negativo, si deve considerare l'intervallo

$$H = (3, 6),$$

che è pertanto l'insieme di definizione della funzione $h(x)$.

d) Dato che la radice è pari, la funzione $k(x)$ è definita se e solo se l'argomento è positivo. Ricordiamo ora che

$$\cos(y) \geq \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad y \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right].$$

Dato che nella funzione compare $\cos(9x)$, definendo $y = 9x$ si ha che la funzione $k(x)$ è definita nell'insieme

$$K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{27} + \frac{2}{9}k\pi, \frac{\pi}{27} + \frac{2}{9}k\pi \right],$$

che non è un intervallo.

6) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} f(x) = \frac{\sin(2x)}{\operatorname{tg}(x) - 1}, & \text{b)} g(x) = \sqrt{6^{\sqrt{x-5}} - 36}, \\ \text{c)} h(x) = \sqrt{x-3} + \sqrt{9-x^2}, & \text{d)} k(x) = \sqrt{\log_4(x-9) - 2}. \end{array}$$

Soluzione:

a) Il denominatore della frazione che definisce $f(x)$ si annulla quando $\operatorname{tg}(x) = 1$, ovvero per

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Per tali valori si ha

$$2x = 2\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

e quindi $\sin(2x) = 1$ qualsiasi sia il valore di k . Si ha pertanto che l'insieme di definizione di $f(x)$ è

$$F = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\},$$

che non è un intervallo.

b) Affinché la funzione $g(x)$ sia definita deve essere, contemporaneamente, $x - 5 \geq 0$ (condizione di esistenza per la radice “interna”) e $6^{\sqrt{x-5}} - 36 \geq 0$ (condizione di esistenza per la radice “interna”). La prima condizione è $x \geq 5$, mentre per la seconda si ha

$$6^{\sqrt{x-5}} - 36 \geq 0 \iff 6^{\sqrt{x-5}} \geq 36 \iff 6^{\sqrt{x-5}} \geq 6^2 \iff \iff \sqrt{x-5} \geq 2,$$

da cui segue che deve essere $x - 5 \geq 4$, ovvero $x \geq 9$. Delle due condizioni, la seconda è più forte della prima, e quindi l'insieme di definizione di $g(x)$ è

$$G = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 9\} = [9, +\infty),$$

che è un intervallo (illimitato superiormente).

c) Affinché la funzione $h(x)$ sia definita, devono essere contemporaneamente maggiori o uguali di zero gli argomenti delle radici; deve quindi essere

$$x - 3 \geq 0, \quad \text{e} \quad 9 - x^2 \geq 0.$$

Risolvendo la prima disequazione, si ha che deve essere $x \geq 3$; risolvendo la seconda, si ha che deve essere $-3 \leq x \leq 3$. Ne segue quindi che l'insieme di definizione della funzione $h(x)$ è

$$H = [3, +\infty) \cap [-3, 3] = \{3\},$$

che non è un intervallo (o, al massimo, è un intervallo degenere).

d) Affinché la funzione $k(x)$ sia definita, deve essere positivo l'argomento del logaritmo, e maggiore o uguale a zero l'argomento della radice; deve quindi essere

$$x - 9 > 0 \quad \text{e} \quad \log_4(x - 9) - 2 \geq 0.$$

La prima disequazione è equivalente a $x > 9$, mentre per la seconda si ha

$$\log_4(x - 9) - 2 \geq 0 \iff \log_4(x - 9) \geq 2 \iff x - 9 \geq 4^2 \iff x \geq 25.$$

Dato che la seconda condizione è più forte della prima, l'insieme di definizione della funzione $k(x)$ è l'intervallo (illimitato superiormente)

$$K = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 25\} = [25, +\infty).$$