

Calcolo differenziale — Compito di pre-esonero 6 Novembre 2023 — Compito n. 00182

Istruzioni: le prime due caselle (V / F)permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "C" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data.

Per selezionare una casella, annerirla completamente: \blacksquare (non \boxtimes o \bigcirc).

Nome:				
Cognome:				
Matricola:				

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4 C	4 D
\mathbf{v}																
\mathbf{F}																
\mathbf{C}																

1) Sia

$$E = \{ x \in \mathbb{R} : |x - 6| \le 9 \} .$$

- **1A)** L'insieme E è un intervallo.
- **1B)** L'insieme E non è limitato.
- **1C)** Non esiste il minimo di E.
- **1D)** Se $F = E \cap (-\infty, 0)$, non esiste il massimo di F.
- 2) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.
- **2A)** Il dominio di $f(x) = \log(|x 9|)$ è $\{x \neq 9\}$. **2B)** Il dominio di $g(x) = \frac{x 7}{x^2 64}$ è $\{x \neq \pm 8\}$.
- **2C)** Il dominio di $h(x) = \sqrt{\frac{64}{x^2}} 1 \ \text{è} \ [-8, 8].$
- **2D)** Il dominio di $k(x) = \sqrt[3]{x^2 49}$ è $\{|x| \ge 7\}$.

- 3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.
- 3A) $\lim_{n \to +\infty} \frac{n^7}{6^n} = +\infty.$
- 3B) $\lim_{n \to +\infty} \frac{10^n + n^2}{8^n + n!} = +\infty.$
- 3C) $\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{7^n + 12^n} = 0.$
- 3D) $\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{4}{n^{10}}\right)^{n^4} = 1.$
- 4) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.
- 4A) $\lim_{n \to +\infty} n^7 \sin\left(\frac{4}{n^7}\right) = 4.$
- 4B) $\lim_{n \to +\infty} \frac{1 - \cos\left(\frac{6}{n}\right)}{\sin^2\left(\frac{11}{n}\right)} = \frac{18}{121} .$
- 4C) $\lim_{n \to +\infty} \sin(n^6) \sin\left(\frac{8}{n^6}\right) = 8.$
- 4D) $\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{6^n} \left[\arctan \left(\frac{9^n}{n!} \right) \right]^2 = +\infty.$

Docente

- Garroni [A, F]
 - Orsina [G, Z]

Co	gnome Nome	Matricola	Compito 00182
----	------------	-----------	---------------

5) Siano

$$a_n = \frac{7n+8}{7n+6}$$
, $E = \{a_n, n \in \mathbb{N}\}$, $f(x) = \log(-x^2 + 18x - 72)$.

- a) Dimostrare che la successione a_n è monotona decrescente.
- \mathbf{b}) Calcolare estremo superiore ed inferiore dell'insieme E, specificando se siano rispettivamente massimo e minimo.
- c) Determinare il dominio dom(f) della funzione f(x).
- d) Calcolare estremo superiore ed inferiore dell'insieme dom(f), specificando se siano rispettivamente massimo e minimo.

6) Si calcolino i seguenti limiti:

a)
$$\lim_{n \to +\infty} [\sqrt{n+5} - \sqrt{n-5}]$$
,

b)
$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n! + 5^n}{8^n + n^9}$$

a)
$$\lim_{n \to +\infty} \left[\sqrt{n+5} - \sqrt{n-5} \right],$$
 b) $\lim_{n \to +\infty} \frac{n! + 5^n}{8^n + n^9},$ c) $\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{2}{n^9 + 9} \right)^{n^9},$ d) $\lim_{n \to +\infty} \frac{e^{\frac{5}{n^2} - 1}}{\tan^2 \left(\frac{6}{n} \right)}.$

$$\mathbf{d)} \lim_{n \to +\infty} \frac{e^{\frac{5}{n^2}} - 1}{\tan^2\left(\frac{6}{n}\right)}.$$

Soluzioni del compito 00182

1) Sia

$$E = \{ x \in \mathbb{R} : |x - 6| \le 9 \}.$$

Risolvendo la disequazione, si ha

$$|x-6| \le 9$$
 \iff $-9 \le x - 6 \le 9$ \iff $-3 \le x \le 15$,

e quindi

(1)
$$E = \{x \in \mathbb{R} : -3 \le x \le 15\} = [-3, 15].$$

1A) L'insieme E è un intervallo.

Vero: Dalla (1) segue che E è un intervallo.

1B) L'insieme E non è limitato.

Falso: Dalla (1) segue che E è limitato.

1C) Non esiste il minimo di E.

Falso: Dalla (1) segue che l'estremo inferiore di E è I=-3. Dato che I appartiene ad E, I è il minimo di E.

1D) Se $F = E \cap (-\infty, 0)$, non esiste il massimo di F.

Vero: Dalla (1) segue che

$$F = E \cap (-\infty, 0) = [-3, 15] \cap (-\infty, 0) = [-3, 0).$$

Si ha pertanto che l'estremo superiore di F è S=0. Dato che S non appartiene ad F, non esiste il massimo di F.

2) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

2A) Il dominio di
$$f(x) = \log(|x - 9|)$$
 è $\{x \neq 9\}$.

Vero: Ricordando che il logaritmo è definito solo per argomenti positivi, la funzione f(x) è definita per ogni x reale tale che |x-9| > 0; dato che tale disuguaglianza è verificata per ogni $x \neq 9$, il dominio di f(x) è

$$dom(f) = \{x \neq 9\}.$$

2B) Il dominio di
$$g(x) = \frac{x-7}{x^2-64}$$
 è $\{x \neq \pm 8\}$.

Vero: La funzione è definita per ogni x che non annulla il denominatore della frazione. Dato che $x^2 - 64 = 0$ se e solo se $x = \pm 8$, si ha

$$dom(g) = \{x \neq \pm 8\}.$$

2C) Il dominio di
$$h(x) = \sqrt{\frac{64}{x^2} - 1}$$
 è $[-8, 8]$.

Falso: Affinché la funzione sia definita, deve essere definito, e positivo, l'argomento della radice quadrata, che è la funzione

$$h_1(x) = \frac{64}{x^2} - 1.$$

Chiaramente $h_1(x)$ è definita per ogni $x \neq 0$, mentre si ha (dato che $x^2 > 0$ per ogni $x \neq 0$)

$$h_1(x) \ge 0 \quad \iff \quad \frac{64}{x^2} \ge 1 \quad \iff \quad 64 \ge x^2 \quad \iff \quad -8 \le x \le 8.$$

Pertanto, $h_1(x)$ è definita e positiva nell'insieme $[-8,8] \setminus \{0\}$, e quindi

$$dom(h) = [-8, 8] \setminus \{0\} \neq [-8, 8].$$

2D) Il dominio di
$$k(x) = \sqrt[3]{x^2 - 49}$$
 è $\{|x| \ge 7\}$.

Falso: Dato che le radici è di ordine dispari sono definite su tutto \mathbb{R} , e dato che la funzione $k_1(x) = x^2 - 49$ è definita per ogni x reale, si ha

$$dom(k) = \mathbb{R} \neq \{|x| \ge 7\}.$$

3A)

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^7}{6^n} = +\infty.$$

Falso: Per la gerarchia degli infiniti (per la quale gli esponenziali "battono" le potenze di n all'infinito) si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^7}{6^n} = 0 \neq +\infty.$$

3B)

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{10^n + n^2}{8^n + n!} = +\infty.$$

Falso: Mettendo in evidenza al numeratore ed al denominatore i termini che divergono più velocemente, si ha

$$\frac{10^n + n^2}{8^n + n!} = \frac{10^n}{n!} \frac{1 + \frac{n^2}{10^n}}{1 + \frac{8^n}{n!}}.$$

Dato che, per la gerarchia degli infiniti,

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^2}{10^n} = 0, \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{8^n}{n!} = 0, \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{10^n}{n!} = 0,$$

si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \, \frac{10^n + n^2}{8^n + n!} = \lim_{n \to +\infty} \, \frac{10^n}{n!} \, \frac{1 + \frac{n^2}{10^n}}{1 + \frac{8^n}{n!}} = 0 \cdot \frac{1 + 0}{1 + 0} = 0 \neq +\infty \, .$$

3C)

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{7^n + 12^n} = 0.$$

Falso: Si ha

$$\frac{n!}{7^n + 12^n} = \frac{n!}{12^n} \frac{1}{1 + \frac{7^n}{12^n}} = \frac{n!}{12^n} \frac{1}{1 + \left(\frac{7}{12}\right)^n}.$$

Dato che, per la gerarchia degli infiniti,

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{12^n} = +\infty, \qquad \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{7}{12}\right)^n = 0,$$

si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \, \frac{n!}{7^n + 12^n} = \lim_{n \to +\infty} \, \frac{n!}{12^n} \, \frac{1}{1 + \left(\frac{7}{12}\right)^n} = (+\infty) \cdot \frac{1}{1+0} = +\infty \neq 0 \, .$$

3D)

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{4}{n^{10}}\right)^{n^4} = 1.$$

Vero: Si ha

$$\left(1 + \frac{4}{n^{10}}\right)^{n^4} = \left[\left(1 + \frac{4}{n^{10}}\right)^{n^{10}}\right]^{\frac{n^4}{n^{10}}} = \left[\left(1 + \frac{4}{n^{10}}\right)^{n^{10}}\right]^{\frac{1}{n^6}}.$$

Pertanto, ricordando che

$$\lim_{n \to +\infty} \, \left(1 + \frac{4}{n^{10}}\right)^{n^{10}} = \mathrm{e}^4 \, ,$$

e che $\frac{1}{n^6}$ tende a zero, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{4}{n^{10}} \right)^{n^4} = \lim_{n \to +\infty} \left[\left(1 + \frac{4}{n^{10}} \right)^{n^{10}} \right]^{\frac{1}{n^6}} = [e^4]^0 = 1.$$

4A)

$$\lim_{n \to +\infty} n^7 \sin\left(\frac{4}{n^7}\right) = 4.$$

Vero: Ricordando che se a_n è una successione che tende a zero si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = 1 \,,$$

si ha, ponendo $a_n = 4/n^7$,

$$n^7 \sin\left(\frac{4}{n^7}\right) = 4 \frac{n^7}{4} \sin\left(\frac{4}{n^7}\right) = 4 \frac{\sin\left(\frac{4}{n^7}\right)}{\frac{4}{n^7}},$$

e quindi

$$\lim_{n \to +\infty} n^7 \sin\left(\frac{4}{n^7}\right) = \lim_{n \to +\infty} 4 \frac{\sin\left(\frac{4}{n^7}\right)}{\frac{4}{n^7}} = 4 \cdot 1 = 4.$$

4B)

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1 - \cos\left(\frac{6}{n}\right)}{\sin^2\left(\frac{11}{n}\right)} = \frac{18}{121}.$$

Vero: Ricordando che se a_n tende a zero allora

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = 1, \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{1 - \cos(a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2},$$

si ha

$$\frac{1-\cos\left(\frac{6}{n}\right)}{\sin^2\left(\frac{11}{n}\right)} = \frac{1-\cos\left(\frac{6}{n}\right)}{\left(\frac{6}{n}\right)^2} \frac{\left(\frac{6}{n}\right)^2}{\left(\frac{11}{n}\right)^2} \frac{\left(\frac{11}{n}\right)^2}{\sin^2\left(\frac{11}{n}\right)} = \frac{36}{121} \frac{1-\cos\left(\frac{6}{n}\right)}{\left(\frac{6}{n}\right)^2} \left(\frac{\frac{11}{n}}{\sin\left(\frac{11}{n}\right)}\right)^2,$$

e quindi

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1 - \cos\left(\frac{6}{n}\right)}{\sin^2\left(\frac{11}{n}\right)} = \lim_{n \to +\infty} \frac{36}{121} \frac{1 - \cos\left(\frac{6}{n}\right)}{\left(\frac{6}{n}\right)^2} \left(\frac{\frac{11}{n}}{\sin\left(\frac{11}{n}\right)}\right)^2 = \frac{36}{121} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{18}{121}.$$

4C)

$$\lim_{n \to +\infty} \sin(n^6) \sin\left(\frac{8}{n^6}\right) = 8.$$

Falso: La successione $\sin(n^6)$ è limitata, mentre, dato che $8/n^6$ tende a zero, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \sin\left(\frac{8}{n^6}\right) = 0.$$

Pertanto,

$$\lim_{n \to +\infty} \sin(n^6) \sin\left(\frac{8}{n^6}\right) = 0 \neq 8,$$

dato che si tratta del prodotto tra una successione limitata ed una che tende a zero.

4D)

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{6^n} \left[\arctan \left(\frac{9^n}{n!} \right) \right]^2 = +\infty.$$

Falso: Dato che $9^n/n!$ tende a zero, si ha

$$\arctan\left(\frac{9^n}{n!}\right) \approx \frac{9^n}{n!}$$
.

Pertanto

$$\frac{n!}{6^n} \left[\arctan \left(\frac{9^n}{n!} \right) \right]^2 \approx \frac{n!}{6^n} \left[\frac{9^n}{n!} \right]^2 = \frac{n!}{6^n} \frac{81^n}{(n!)^2} = \frac{\left(\frac{27}{2} \right)^n}{n!} \,.$$

Ricordando la gerarchia degli infiniti, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{6^n} \left[\arctan\left(\frac{9^n}{n!}\right) \right]^2 = \lim_{n \to +\infty} \frac{\left(\frac{27}{2}\right)^n}{n!} = 0 \neq +\infty.$$

5) Siano

$$a_n = \frac{7n+8}{7n+6}$$
, $E = \{a_n, n \in \mathbb{N}\}$, $f(x) = \log(-x^2 + 18x - 72)$.

- a) Dimostrare che la successione a_n è monotona decrescente.
- b) Calcolare estremo superiore ed inferiore dell'insieme E, specificando se siano rispettivamente massimo e minimo.
- c) Determinare il dominio dom(f) della funzione f(x).
- d) Calcolare estremo superiore ed inferiore dell'insieme dom(f), specificando se siano rispettivamente massimo e minimo.

Soluzione:

a) Si ha

$$a_{n+1} \le a_n \iff \frac{7(n+1)+8}{7(n+1)+6} \le \frac{7n+8}{7n+6}$$

che è equivalente a

$$(7(n+1)+8)(7n+6) \le (7n+8)(7(n+1)+6).$$

Sviluppando i prodotti, si ha che deve essere

$$49 n (n + 1) + 42 (n + 1) + 56 n + 48 \le 49 n (n + 1) + 42 n + 56 (n + 1) + 48$$

e quindi, semplificando i termini uguali ed espandendo i rimanenti,

$$42n + 42 + 56n \le 42n + 56n + 56 \iff 42 \le 56$$

che è vero. La successione a_n è quindi monotona decrescente.

Analogamente, si poteva osservare che

$$a_n = \frac{7n+8}{7n+6} = \frac{7n+6+8-6}{7n+6} = 1 + \frac{2}{7n+6}$$

$$\geq 1 + \frac{2}{7(n+1)+6} = \frac{7(n+1)+6+8-6}{7(n+1)+6}$$

$$= \frac{7(n+1)+8}{7(n+1)+6} = a_{n+1}.$$

b) Dato che la successione a_n è monotona decrescente, si ha

$$\sup(E) = \max(E) = a_0 = \frac{4}{3}, \quad \inf(E) = \lim_{n \to +\infty} a_n = \frac{7}{7} = 1,$$

dato che a_n è definita dal rapporto di due polinomi di primo grado. L'estremo inferiore non è un minimo dato che non esiste n in \mathbb{N} tale che $a_n = 1$. Infatti

$$a_n = 1$$
 \iff $\frac{7n+8}{7n+6} = 1$ \iff $7n+8 = 7n+6$ \iff $8 = 6$,

che è falso.

c) Il logaritmo è definito se e solo se il suo argomento è positivo; dato che

$$-x^2 + 18x - 72 > 0 \iff x^2 - 18x + 72 < 0$$

si tratta di risolvere quest'ultima disequazione. Si ha $x^2 - 18x + 72 = 0$ per x = 6 e per x = 12, e quindi

$$x^2 - 18x + 72 < 0 \iff 6 < x < 12$$

da cui segue che

$$dom(f) = (6, 12)$$
.

d) Dato che dom(f) = (6, 12), si ha

$$\sup(\operatorname{dom}(f)) = 12, \quad \inf(\operatorname{dom}(f)) = 6,$$

che non sono, rispettivamente, né massimo (dato che 12 non appartiene all'insieme), né minimo (dato che 6 non appartiene all'insieme).

6) Si calcolino i seguenti limiti:

a)
$$\lim_{n \to +\infty} \left[\sqrt{n+5} - \sqrt{n-5} \right]$$
, b) $\lim_{n \to +\infty} \frac{n! + 5^n}{8^n + n^9}$

c)
$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{2}{n^9 + 9} \right)^{n^9}$$
, d) $\lim_{n \to +\infty} \frac{e^{\frac{5}{n^2}} - 1}{\tan^2 \left(\frac{6}{n} \right)}$.

Soluzione:

a) Si ha, razionalizzando,

$$\sqrt{n+5} - \sqrt{n-5} = \frac{(\sqrt{n+5} - \sqrt{n-5})(\sqrt{n+5} + \sqrt{n-5})}{\sqrt{n+5} + \sqrt{n-5}} = \frac{n+5 - (n-5)}{\sqrt{n+5} + \sqrt{n-5}},$$

cosicché (semplificando)

$$\sqrt{n+5} - \sqrt{n-5} = \frac{10}{\sqrt{n+5} + \sqrt{n-5}}.$$

Pertanto (dato che il denominatore diverge)

$$\lim_{n \to +\infty} \left[\sqrt{n+5} - \sqrt{n-5} \right] = \lim_{n \to +\infty} \frac{10}{\sqrt{n+5} + \sqrt{n-5}} = 0.$$

b) Ricordando la gerarchia degli infiniti, mettiamo in evidenza n! al numeratore e 8^n al denominatore. Si ha

$$\frac{n! + 5^n}{8^n + n^9} = \frac{n!}{8^n} \frac{1 + \frac{5^n}{n!}}{1 + \frac{n^9}{8^n}}.$$

Dato che (sempre per la gerarchia degli infiniti)

$$\lim_{n\to +\infty} \frac{n!}{8^n} = +\infty\,, \qquad \lim_{n\to +\infty} \frac{5^n}{n!} = 0\,, \qquad \lim_{n\to +\infty} \frac{n^9}{8^n} = 0\,,$$

si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n! + 5^n}{8^n + n^9} = \lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{8^n} \frac{1 + \frac{5^n}{n!}}{1 + \frac{n^9}{8^n}} = (+\infty) \cdot \frac{1 + 0}{1 + 0} = +\infty.$$

c) Ricordando che se a_n è una successione divergente a più infinito, e se A è un numero reale, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{A}{a_n} \right)^{a_n} = e^A,$$

riscriviamo la successione come segue:

$$\left(1 + \frac{2}{n^9 + 9}\right)^{n^9} = \left[\left(1 + \frac{2}{n^9 + 9}\right)^{n^9 + 9}\right]^{\frac{n^9}{n^9 + 9}}.$$

Dato che, trattandosi del rapporto tra due polinomi dello stesso grado, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^9}{n^9 + 9} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1 \cdot n^9}{1 \cdot n^9 + 9} = \frac{1}{1} = 1,$$

ne segue che

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{2}{n^9 + 9} \right)^{n^9} = \lim_{n \to +\infty} \left[\left(1 + \frac{2}{n^9 + 9} \right)^{n^9 + 9} \right]^{\frac{n^9}{n^9 + 9}} = [e^2]^1 = e^2.$$

d) Ricordando che se a_n è una successione che tende a zero, allora

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} = 1, \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{\tan(a_n)}{a_n} = 1,$$

scriviamo

$$\frac{\mathrm{e}^{\frac{5}{n^2}}-1}{\tan^2\left(\frac{6}{n}\right)} = \frac{\mathrm{e}^{\frac{5}{n^2}}-1}{\frac{5}{n^2}} \frac{\frac{5}{n^2}}{\left(\frac{6}{n}\right)^2} \frac{\left(\frac{6}{n}\right)^2}{\tan^2\left(\frac{6}{n}\right)} = \frac{5}{36} \frac{\mathrm{e}^{\frac{5}{n^2}}-1}{\frac{5}{n^2}} \left(\frac{\frac{6}{n}}{\tan\left(\frac{6}{n}\right)}\right)^2.$$

Pertanto,

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\mathrm{e}^{\frac{5}{n^2}} - 1}{\tan^2\left(\frac{6}{n}\right)} = \lim_{n \to +\infty} \frac{5}{36} \frac{\mathrm{e}^{\frac{5}{n^2}} - 1}{\frac{5}{n^2}} \left(\frac{\frac{6}{n}}{\tan\left(\frac{6}{n}\right)}\right)^2 = \frac{5}{36} \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{1}\right)^2 = \frac{5}{36} \,.$$