



Calcolo differenziale — Scheda di esercizi n. 3
16 Ottobre 2023 — Compito n. 00290

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella “**C**” serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data. Per selezionare una casella, annerirla completamente: ■ (non ☒ o ☑).

Nome: _____

Cognome: _____

Matricola:

--	--	--	--	--	--	--

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Sia

$$E = \left\{ \frac{8}{n}, n \geq 1 \right\}.$$

- 1A) L'insieme E è un intervallo.
1B) L'insieme E non è limitato.
1C) Esiste il massimo di E .
1D) Non esiste il minimo di E .

2) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : \sin(10x) > 0\} \cap [0, \pi].$$

- 2A) L'insieme E è un intervallo.
2B) L'insieme E non è limitato.
2C) Si ha $\sup(E) = \pi$.
2D) Si ha $\inf(E) > 0$.

3) Si consideri la successione

$$a_n = \frac{6n+1}{3n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

3A)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

3B)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [a_{n+1} - a_n] = 2.$$

3C)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n[a_{n+1} - a_n] = +\infty.$$

3D)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2[a_{n+1} - a_n] = 1/3.$$

4) Siano $A > 0$, $B > 0$ e

$$a_n = \frac{A n^2 + 1}{B n^2 + 1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

4A) La successione a_n diverge positivamente.

4B) Se $A = 14$ e $B = 9$, la successione a_n è monotona decrescente.

4C) Se $A = 8$ e $B = 11$, la successione a_n è monotona decrescente.

4D) Se $A = 9$ e $B = 2$, esiste il massimo dell'insieme

$$E = \{a_n, n \in \mathbb{N}\}.$$

Docente

- ☐ Garroni [A, F]
☐ Orsina [G, Z]

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00290

5) Si calcolino i seguenti limiti:

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^2 + 6n + 11}{6n^2 + 3n + 2},$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^8 - 7}{3 - 5n^4},$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n + n^{11}}{7 \cdot 7^n + 8},$ d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{14} 7^n}{9^n + n^9},$

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00290

6) Sia

$$a_n = \frac{3 \cdot 6^n + 14}{6^n + 5}.$$

- a) Si dimostri che la successione $\{a_n\}$ è limitata.
b) Si dimostri che la successione $\{n^3 a_n\}$ è illimitata superiormente.
c) Si dimostri che si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup(\{a_n, n \in \mathbb{N}\}).$$

- d) Si calcoli il minimo della successione $\{a_n\}$.
-

Soluzioni del compito 00290

1) Sia

$$E = \left\{ \frac{8}{n}, n \geq 1 \right\}.$$

1A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Per definizione, $b = \frac{8}{1} = 8$ e $a = \frac{8}{2} = 4$ appartengono ad E . Se consideriamo il numero

$$x = \frac{a+b}{2} = \frac{4+8}{2} = 6,$$

si vede facilmente che non appartiene ad E . Infatti, risolvendo l'equazione

$$\frac{8}{n} = 6,$$

si trova

$$n = \frac{3}{4},$$

che non è un numero intero. Abbiamo quindi trovato a e b in E tali che $[a, b]$ non è tutto contenuto in E , e quindi E non è un intervallo.

1B) L'insieme E non è limitato.

Falso: Dato che

$$0 < \frac{8}{n} \leq \frac{8}{1} = 8, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

l'insieme E è contenuto nell'intervallo $(0, 8]$, ed è quindi limitato.

1C) Esiste il massimo di E .

Vero: Dato che

$$\frac{8}{n} \leq \frac{8}{1} = 8, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

il numero $x = 8$ è più grande di tutti gli elementi di E . Dato che appartiene ad E , si ha che il massimo di E esiste, e vale 8.

1D) Non esiste il minimo di E .

Vero: Supponiamo che esista il minimo di E , ovvero un numero reale m della forma $\frac{8}{\bar{n}}$, per qualche intero $\bar{n} \geq 1$, con la proprietà che $m \leq y$ per ogni y in E . Se, però, scegliamo

$$y = \frac{8}{\bar{n} + 1},$$

abbiamo che y appartiene ad E (per definizione), e che

$$y = \frac{8}{\bar{n} + 1} < \frac{8}{\bar{n}} = m,$$

contraddicendo la minimalità di m .

2) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : \sin(10x) > 0\} \cap [0, \pi].$$

Ricordando che $\sin(y) > 0$ se e solo se

$$2k\pi < y < (2k+1)\pi, \quad \text{per qualche } k \text{ in } \mathbb{Z},$$

si ha $\sin(10x) > 0$ se e solo se

$$2k\pi < 10x < (2k+1)\pi \iff \frac{2k}{10}\pi < x < \frac{2k+1}{10}\pi, \quad \text{per qualche } k \text{ in } \mathbb{Z}.$$

Se chiediamo, inoltre, che x appartenga a $[0, \pi]$, allora k varia tra 0 e 4. Infatti, se $k < 0$ e

$$\frac{2k}{10}\pi < x < \frac{2k+1}{10}\pi,$$

allora $x < 0$ e quindi non appartiene a $[0, \pi]$, mentre se $k \geq 5$ e

$$\frac{2k}{10}\pi < x < \frac{2k+1}{10}\pi,$$

allora $x > \pi$ (e quindi non è in $[0, \pi]$). In definitiva, si ha

$$(1) \quad E = \bigcup_{k=0}^4 \left(\frac{2k\pi}{10}, \frac{(2k+1)\pi}{10} \right) = \bigcup_{k=0}^4 I_k.$$

2A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Come si vede dalla (1), E è l'unione di 5 intervalli disgiunti, e quindi non è un intervallo. Per vederlo meglio,

$$E = \left(0, \frac{\pi}{10}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{10}, \frac{3\pi}{10}\right) \cup \left[\bigcup_{k=2}^4 \left(\frac{2k\pi}{10}, \frac{(2k+1)\pi}{10} \right) \right],$$

e quindi in E non c'è alcun numero reale x tale che

$$0 < a = \frac{\pi}{20} < \frac{\pi}{10} \leq x \leq \frac{2\pi}{10} < \frac{5\pi}{20} = b < \frac{3\pi}{10},$$

con a e b appartenenti ad E .

2B) L'insieme E non è limitato.

Falso: Dalla definizione, si ha $E \subseteq [0, \pi]$, e quindi E è un insieme limitato.

2C) Si ha $\sup(E) = \pi$.

Falso: Dalla (1), si ha che l'intervallo “più a destra” che forma E è l'intervallo corrispondente a $k = 4$, ovvero l'intervallo

$$I_4 = \left(\frac{8\pi}{10}, \frac{9\pi}{10} \right).$$

Dato che $\sup(I_4) = \frac{9\pi}{10} < \pi$, si ha $\sup(E) = \sup(I_4) < \pi$.

2D) Si ha $\inf(E) > 0$.

Falso: Dalla (1), si ha che l'intervallo “più a sinistra” che forma E è l'intervallo corrispondente a $k = 0$, ovvero l'intervallo

$$I_0 = \left(0, \frac{\pi}{10} \right).$$

Dato che $\inf(I_0) = 0$, si ha $\inf(E) = \inf(I_0) = 0$.

3) Si consideri la successione

$$a_n = \frac{6n+1}{3n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Si ha

$$a_{n+1} - a_n = \frac{6(n+1)+1}{3(n+1)+1} - \frac{6n+1}{3n+1} = \frac{[6(n+1)+1][3n+1] - [6n+1][3(n+1)+1]}{(3(n+1)+1)(3n+1)}.$$

Sviluppando il numeratore, si ha

$$\begin{aligned} & [6(n+1)+1][3n+1] - [6n+1][3(n+1)+1] \\ &= 6 \cdot 3n(n+1) + 6(n+1) + 3n+1 \\ & \quad - [6 \cdot 3n(n+1) + 6n + 3(n+1) + 1] \\ &= 6 - 3 = 3. \end{aligned}$$

Sviluppando il denominatore, invece, si ha

$$(3(n+1)+1)(3n+1) = 9n(n+1) + 3(n+1) + 3n+1 = 9n^2 + 15n + 4.$$

Pertanto,

$$(1) \quad a_{n+1} - a_n = \frac{3}{9n^2 + 15n + 4}.$$

3A)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

Falso: Si ha

$$a_n = \frac{6n+1}{3n+1} = \frac{n}{n} \frac{6 + \frac{1}{n}}{3 + \frac{1}{n}} = \frac{6 + \frac{1}{n}}{3 + \frac{1}{n}}.$$

Dato che $\frac{1}{n}$ tende a zero, si ha, per i teoremi sui limiti,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6 + \frac{1}{n}}{3 + \frac{1}{n}} = \frac{6+0}{3+0} = 2 \neq 0.$$

3B)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [a_{n+1} - a_n] = 2.$$

Falso: Dato che (si veda l'esercizio precedente) si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2,$$

si ha anche

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} = 2.$$

Per i teoremi sui limiti, si ha allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [a_{n+1} - a_n] = 2 - 2 = 0 \neq 2.$$

3C)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n[a_{n+1} - a_n] = +\infty.$$

Falso: Dalla (1) si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n[a_{n+1} - a_n] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{9n^2 + 15n + 4} = 0,$$

dato che è il limite del rapporto di due polinomi, con il grado del denominatore (2) maggiore del grado del numeratore (1).

3D)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 [a_{n+1} - a_n] = 1/3.$$

Vero: Dalla (1) si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 [a_{n+1} - a_n] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2}{9n^2 + 15n + 4}.$$

Dato che si tratta del rapporto di due polinomi di secondo grado, il limite è il rapporto dei coefficienti dei termini di grado massimo, che sono 3 e 9. Pertanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 [a_{n+1} - a_n] = \frac{1}{3}.$$

4) Siano $A > 0$, $B > 0$ e

$$a_n = \frac{A n^2 + 1}{B n^2 + 1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Per studiare la monotonia di a_n , calcoliamo $a_{n+1} - a_n$. Si ha

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{A(n+1)^2 + 1}{B(n+1)^2 + 1} - \frac{A n^2 + 1}{B n^2 + 1} \\ &= \frac{[A(n+1)^2 + 1][B n^2 + 1] - [B(n+1)^2 + 1][A n^2 + 1]}{[B(n+1)^2 + 1][B n^2 + 1]}. \end{aligned}$$

Osserviamo che il denominatore è sempre positivo (perché $B > 0$), e quindi si ha $a_{n+1} > a_n$ se e solo se

$$[A(n+1)^2 + 1][B n^2 + 1] - [B(n+1)^2 + 1][A n^2 + 1] > 0.$$

Sviluppando i prodotti si ha

$$A B (n+1)^2 n^2 + A (n+1)^2 + B n^2 + 1 - [A B (n+1)^2 n^2 + B (n+1)^2 + A n^2 + 1] > 0,$$

che diventa, dopo aver semplificato i termini uguali

$$A(n+1)^2 + B n^2 > B(n+1)^2 + A n^2.$$

Sviluppando i quadrati, si ha che deve essere

$$A n^2 + 2A n + A + B n^2 > B n^2 + 2B n + B + A n^2,$$

che è equivalente a

$$2A n + A > 2B n + B \quad \Longleftrightarrow \quad 2(A - B)n + A - B > 0,$$

e questa disuguaglianza è vera per ogni n in \mathbb{N} se e solo se $A > B$. In definitiva,

(1) la successione a_n è monotona crescente se e solo se $A > B$.

4A) La successione a_n diverge positivamente.

Falso: Si ha

$$a_n = \frac{A n^2 + 1}{B n^2 + 1} = \frac{n^2}{n^2} \frac{A + \frac{1}{n^2}}{B + \frac{1}{n^2}} = \frac{A + \frac{1}{n^2}}{B + \frac{1}{n^2}}.$$

Dato che $\frac{1}{n^2}$ tende a zero, per i teoremi sui limiti si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A + \frac{1}{n^2}}{B + \frac{1}{n^2}} = \frac{A + 0}{B + 0} = \frac{A}{B},$$

che non è $+\infty$ perché $B \neq 0$ per ipotesi.

4B) Se $A = 14$ e $B = 9$, la successione a_n è monotona decrescente.

Falso: Dato che $A > B$, per la (1) la successione è monotona crescente.

4C) Se $A = 8$ e $B = 11$, la successione a_n è monotona decrescente.

Vero: Dato che $A < B$, per la (1) la successione è monotona decrescente.

4D) Se $A = 9$ e $B = 2$, esiste il massimo dell'insieme

$$E = \{a_n, n \in \mathbb{N}\}.$$

Falso: Dato che $A > B$, per la (1) la successione a_n è monotona crescente. Si ha quindi (si veda l'esercizio **4A**) che

$$\sup(E) = \sup(\{a_n, n \in \mathbb{N}\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{9}{2}.$$

Per dimostrare che l'estremo superiore non è un massimo, è sufficiente verificare che non esiste alcun valore di n tale che $a_n = \frac{9}{2}$. Risolvendo l'equazione, si ha

$$\frac{9n^2 + 1}{2n^2 + 1} = \frac{9}{2} \iff 2[9n^2 + 1] = 9[2n^2 + 1] \iff 18n^2 + 2 = 18n^2 + 9 \iff 2 = 9,$$

che è falsa. Si ha quindi che il numero 2 non appartiene ad E , che quindi non ha massimo.

5) Si calcolino i seguenti limiti:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^2 + 6n + 11}{6n^2 + 3n + 2}, & \text{b)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^8 - 7}{3 - 5n^4}, \\ \text{c)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n + n^{11}}{7 \cdot 7^n + 8}, & \text{d)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{14} 7^n}{9^n + n^9}, \end{array}$$

Soluzione:

a) Si tratta del limite del rapporto di polinomi dello stesso grado. Mettendo in evidenza n^2 al numeratore ed al denominatore, si ha

$$\frac{7n^2 + 6n + 11}{6n^2 + 3n + 2} = \frac{n^2}{n^2} \frac{7 + \frac{6}{n} + \frac{11}{n^2}}{6 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}} = \frac{7 + \frac{6}{n} + \frac{11}{n^2}}{6 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}}.$$

Pertanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^2 + 6n + 11}{6n^2 + 3n + 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7 + \frac{6}{n} + \frac{11}{n^2}}{6 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}} = \frac{7 + 0 + 0}{6 + 0 + 0} = \frac{7}{6}.$$

b) Si tratta del limite del rapporto di polinomi, con il grado del numeratore maggiore del grado del denominatore. Mettendo in evidenza n^8 al numeratore e n^4 al denominatore, si ha

$$\frac{n^8 - 7}{3 - 5n^4} = \frac{n^8}{n^4} \frac{1 - \frac{7}{n^8}}{\frac{3}{n^4} - 5} = n^4 \frac{1 - \frac{7}{n^8}}{\frac{3}{n^4} - 5}.$$

Pertanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^8 - 7}{3 - 5n^4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 \frac{1 - \frac{7}{n^8}}{\frac{3}{n^4} - 5} = (+\infty) \cdot \left(\frac{1 - 0}{0 - 5} \right) = (+\infty) \cdot \left(-\frac{1}{5} \right) = -\infty.$$

c) Ricordando che 7^n diverge più velocemente di n^{11} , si ha

$$\frac{7^n + n^{11}}{7 \cdot 7^n + 8} = \frac{7^n}{7^n} \frac{1 + \frac{n^{11}}{7^n}}{7 + \frac{8}{7^n}} = \frac{1 + \frac{n^{11}}{7^n}}{7 + \frac{8}{7^n}}.$$

Pertanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n + n^{11}}{7 \cdot 7^n + 8} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{n^{11}}{7^n}}{7 + \frac{8}{7^n}} = \frac{1 + 0}{7 + 0} = \frac{1}{7}.$$

d) Scriviamo la successione come segue:

$$\frac{n^{14} 7^n}{9^n + n^9} = \frac{\left(\frac{9}{7}\right)^n}{\left(\frac{9}{7}\right)^n} \frac{n^{14} 7^n}{9^n + n^9} = \frac{n^{14}}{\left(\frac{9}{7}\right)^n} \frac{\left(\frac{9}{7}\right)^n \cdot 7^n}{9^n + n^9} = \frac{n^{14}}{\left(\frac{9}{7}\right)^n} \frac{9^n}{9^n + n^9}.$$

Pertanto,

$$0 \leq \frac{n^{14} 7^n}{9^n + n^9} = \frac{n^{14}}{\left(\frac{9}{7}\right)^n} \frac{9^n}{9^n + n^9} \leq \frac{n^{14}}{\left(\frac{9}{7}\right)^n} \cdot 1 = \frac{n^{14}}{\left(\frac{9}{7}\right)^n}.$$

Dato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{14}}{\left(\frac{9}{7}\right)^n} = 0,$$

per il teorema dei carabinieri si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{14} 7^n}{9^n + n^9} = 0.$$

6) Sia

$$a_n = \frac{3 \cdot 6^n + 14}{6^n + 5}.$$

a) Si dimostri che la successione $\{a_n\}$ è limitata.

b) Si dimostri che la successione $\{n^3 a_n\}$ è illimitata superiormente.

c) Si dimostri che si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup(\{a_n, n \in \mathbb{N}\}).$$

d) Si calcoli il minimo della successione $\{a_n\}$.

Soluzione:

a) Si ha

$$0 \leq a_n = \frac{3 \cdot 6^n + 14}{6^n + 5} = \frac{3 \cdot 6^n + 15 - 1}{6^n + 5} = \frac{3(6^n + 5) - 1}{6^n + 5} = 3 - \frac{1}{6^n + 5} \leq 3,$$

e quindi la successione $\{a_n\}$ è limitata.

In alternativa, si ha

$$a_n = \frac{3 \cdot 6^n + 14}{6^n + 5} = \frac{6^n}{6^n} \frac{3 + \frac{14}{6^n}}{1 + \frac{5}{6^n}} = \frac{3 + \frac{14}{6^n}}{1 + \frac{5}{6^n}}.$$

Pertanto, dato che sia $\frac{14}{6^n}$ che $\frac{5}{6^n}$ tendono a zero, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{14}{6^n}}{1 + \frac{5}{6^n}} = \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3.$$

Dato che la successione a_n tende ad un limite finito, è limitata.

b) Dato che la successione a_n converge ad 3 per l'esercizio a), la successione $n^3 a_n$ diverge a più infinito, ed è dunque illimitata superiormente.

c) Dimostriamo che la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente. Si ha

$$a_{n+1} \geq a_n \iff \frac{3 \cdot 6^{n+1} + 14}{6^{n+1} + 5} \geq \frac{3 \cdot 6^n + 14}{6^n + 5},$$

e l'ultima disuguaglianza è equivalente a

$$(3 \cdot 6^{n+1} + 14)(6^n + 5) \geq (3 \cdot 6^n + 14)(6^{n+1} + 5).$$

Sviluppando i prodotti, si ha che deve essere

$$3 \cdot 6^{2n+1} + 15 \cdot 6^{n+1} + 14 \cdot 6^n + 70 \geq 3 \cdot 6^{2n+1} + 15 \cdot 6^n + 14 \cdot 6^{n+1} + 70,$$

che, semplificando, è equivalente a

$$(15 - 14) \cdot 6^{n+1} \geq (15 - 14) \cdot 6^n \iff 6^{n+1} \geq 6^n,$$

che è vera. Pertanto, la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente e quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup(\{a_n, n \in \mathbb{N}\}).$$

d) Dato che per l'esercizio c) la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente, si ha

$$a_n \geq a_0 = \frac{3 \cdot 6^0 + 14}{6^0 + 5} = \frac{3 + 14}{1 + 5} = \frac{17}{6}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e quindi

$$\min(\{a_n, n \in \mathbb{N}\}) = a_0 = \frac{17}{6}.$$