

POROČILO SEMINARSKE NALOGE

# STATISTIKA

SARA BIZJAK

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO  
ODDELEK ZA MATEMATIKO

JULIJ 2020

## 1. NALOGA

Podatki so vzeti iz datoteke `Kibergard`, kjer se nahajajo informacije o 43.886 družinah, ki stanujejo v mestu Kibergard. Za vsako družino so zabeleženi naslednji podatki:

- Tip družine (od 1 do 3)
- Število članov družine
- Število otrok v družini
- Skupni dohodek družine
- Mestna četrt, v kateri stanuje družina (od 1 do 4)
- Stopnja izobrazbe in vodje gospodinjstva (od 31 do 46: opisi v datoteki `z navodili`)

Nalogo sem reševala s pomočjo programa R. Koda, uporabljena za generiranje enostavnih slučajnih vzorcev in izračune, je dostopna v priloženi datoteki *naloga1.R*.

### PRIMER A

Vzamemo enostavni slučajni vzorec 200 družin in na njegovi podlagi ocenimo delež družin v Kibergardu, v katerih vodja gospodinjstva nima srednješolske izobrazbe (niti poklicne niti splošne mature). Opisan delež znaša  $p = 0.195$ .

### PRIMER B

Ocenimo standardno napako in postavimo 95% interval zaupanja.

Standardno napako za delež izračunamo po formuli (na strani 210 v knjigi *John A. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis*):

$$\hat{se}(p) = \sqrt{\frac{p \cdot (1 - p)}{n} \cdot \left(1 - \frac{n - 1}{N - 1}\right)},$$

kjer so  $p = 0.195$ ,  $n = 200$ ,  $N = 43.886$ .

Dobimo rezultat  $\hat{se}(p) = 0.02795203$ .

Interval zaupanja je enak:  $[0.140215, 0.249785]$ .

### PRIMER C

Vzorčni delež in ocenjeno standardno napako primerjamo s populacijskim deležem in pravo standardno napako.

- Vzorčni delež: 0.195
- Populacijski delež: 0.2115025
- Razlika obeh deležev: 0.01650253
- Ocenjena standardna napaka (iz vzorca): 0,02802185
- Prava standardna napaka (iz celotne populacije): 0.02881085
- Razlika med ocenjeno in pravo standardno napako: 0.0008609634

Ker velja  $0.2115025 \in [0.140215, 0.249785]$ , interval zaupanja pokrije populacijski delež.

PRIMER D

GRAF

INTERVALI ZAUPANJA + KOLIKO JIH POKRIJE POPULACIJSKI DELEŽ

PRIMER E

Standardni odklon vzorčnih deležev za 100 prej dobljenih vzorcev je enak 0.02881085. Prava standardna napaka za vzorec velikosti 200 pa je 0.02888282. Razlikujeta se za  $7.196778 \cdot 10^{-5}$ .

PRIMER F

GRAF

INTERVALI ZAUPANJA + KOLIKO JIH POKRIJE POPULACIJSKI DELEŽ

2. NALOGA

3. NALOGA

Opazimo  $n$  neodvisnih realizacij zvezne porazdelitve z gostoto:

$$f(x \mid \sigma) = \begin{cases} \frac{\Gamma(2\alpha)}{(\Gamma(\alpha))^2} [x(1-x)]^{\alpha-1} & ; 0 < x < 1 \\ 0 & ; \text{sicer,} \end{cases}$$

kjer je  $\alpha > 0$  neznan parameter. Če je  $X$  slučajna spremenljivka s to gostoto, se da izračunati:

$$E(X) = \frac{1}{2}, \quad \text{var}(X) = \frac{1}{4(2\alpha + 1)}.$$

#### PRIMER A

Določimo obliko porazdelitve v odvisnosti od  $\alpha$ .

#### PRIMER B

Ocenimo  $\alpha$  po metodi momentov.

Iz podane pričakovane vrednosti in variance lahko izračunamo vrednosti prvega in drugega momenta.

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{3},$$

$$E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \text{var}(X) + E(X)^2 = \frac{1}{4(2\alpha + 1)} + \frac{1}{4}.$$

Iz enačbe drugega momenta izrazimo  $\alpha$ .

$$\begin{aligned} \frac{1}{4(2\alpha + 1)} + \frac{1}{4} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \\ \frac{1}{4(2\alpha + 1)} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2\alpha + 1} &= \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 1 \\ 2\alpha + 1 &= \frac{1}{\frac{4}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 1} \\ \Rightarrow \alpha &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\frac{4}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 1} - 1 \right). \end{aligned}$$

#### PRIMER C

Poiščemo enačbo, ki določa cenilko po metodi največjega verjetja. Pogledamo, kdaj ta cenilka obstaja.

#### PRIMER D

Poiščemo asimptotično varianco cenilke po metodi največjega verjetja.

## 4. NALOGA

## 5. NALOGA

$X$  in  $Y$  sta slučajni spremenljivki, za kateri velja:

- $E(X) = \mu_x$ ,
- $E(Y) = \mu_y$ ,

- $\text{var}(X) = \sigma_x^2$ ,
- $\text{var}(Y) = \sigma_y^2$ ,
- $\text{cov}(X, Y) = \sigma_{x,y}$ .

Opazimo  $X$  in želimo napovedati  $Y$ .

#### PRIMER A

Poiščemo napoved, ki je oblike  $\hat{Y} = \alpha + \beta \cdot X$ , kjer  $\alpha$  in  $\beta$  izberemo tako, da je srednja kvadratična napaka  $E \left[ (Y - \hat{Y})^2 \right]$  minimalna.

Uporabimo namig

$$E \left[ (Y - \hat{Y})^2 \right] = [E(Y) - E(\hat{Y})]^2 + \text{var}(Y - \hat{Y}). \quad (1)$$

Ker sta oba člena desne strani enačbe večja od 0, je dovolj, da poiščemo vrednosti  $\alpha$  in  $\beta$ , ki minimizirata ta dva člena – potem bo najmanjša možna tudi njuna vsota.

Poglejmo si najprej prvi člen enačbe. Vrednost enačbe

$$[E(Y) - E(\hat{Y})]^2 = [\mu_y - \alpha - \beta\mu_x]^2$$

bo najmanjša, ko bo  $\mu_y - \alpha - \beta \cdot \mu_x = 0$ . To pa bo res natanko takrat, ko bo  $\alpha = \mu_y - \beta\mu_x$ .

Poglejmo si še drugi člen enačbe. Vidimo, da je

$$\begin{aligned} \text{var}(Y - \hat{Y}) &= \text{var}(Y - \alpha - \beta X) = \text{var}(Y - \beta X) = \text{var}(Y) - 2\beta \text{cov}(X, Y) + \beta^2 \text{var}(X) \\ &= \sigma_y^2 - 2\beta \sigma_{x,y} + \beta^2 \sigma_x^2 \end{aligned}$$

funkcija spremenljivke  $\beta$ . Za izračun minimuma enačbo najprej odvajamo po  $\beta$  in enačimo z 0.

$$\frac{\partial}{\partial \beta} (\text{var}(Y - \hat{Y})) = -2\sigma_{x,y} + 2\beta\sigma_x^2 = 0$$

To bo res, ko bo  $\beta = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x^2}$ .

Vrednosti  $\alpha$  in  $\beta$ , pri katerih bo izraz  $E \left[ (Y - \hat{Y})^2 \right]$  minimalen, sta

$$\alpha = \mu_y - \mu_x \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x^2} \quad \text{in} \quad \beta = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x^2}$$

# PRIMER B

Pokažemo, da se pri tako izbranih koeficientih *determinacijski koeficient* (kvadrat korelacijskega koeficienta) izraža v obliki

$$r_{x,y}^2 = 1 - \frac{\text{var}(Y - \hat{Y})}{\text{var}(Y)}.$$

Spomnimo se najprej formule za *korelacijski koeficient*:

$$\text{corr}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var}(X)\text{var}(Y)}} = r_{x,y}.$$

Ker je determinacijski koeficient enak kvadratu korelacije, je enak

$$r_{x,y}^2 = \frac{\text{cov}(X, Y)^2}{\text{var}(X)\text{var}(Y)}.$$

Dobimo enakost

$$1 - \frac{\text{var}(Y - \hat{Y})}{\text{var}(Y)} = \frac{\text{cov}(X, Y)^2}{\text{var}(X)\text{var}(Y)}$$

in če upoštevamo še vrednosti  $\alpha$  in  $\beta$  iz prvega dela naloge:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\text{var}(Y - \hat{Y})}{\text{var}(Y)} &= \frac{\text{var}(Y) - \text{var}(Y - \hat{Y})}{\text{var}(Y)} = \frac{\sigma_y^2 - \sigma_y^2 + \frac{\sigma_{x,y}^2}{\sigma_x^2}}{\sigma_y^2} \\ &= \frac{\sigma_{x,y}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{\text{cov}(X, Y)^2}{\text{var}(X)\text{var}(Y)} = r_{x,y}^2. \end{aligned}$$

Pokazali smo, da je determinacijski koeficient res enak  $1 - \frac{\text{var}(Y - \hat{Y})}{\text{var}(Y)}$ .