DOCUMENTO ACCESIBLE DE WEB-MED

GLOSARIO

DESCRIPCIÓN	1
CAUSAS	1
SÍNTOMAS	2
PRUEBAS Y EXÁMENES	2
¿Cómo se calcula el IMC?	2
TRATAMIENTOS	2
CÓDIGO DE AYUDA (COLUMNAS) ¿?????	2
EXPECTATIVAS	3
CASOS Y CONTROLES	3
BIBILOGRAFÍA	⊿

DESCRIPCIÓN

La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por una restricción extrema de la ingesta calórica, un miedo intenso a ganar peso y una imagen corporal distorsionada. Las personas con anorexia se perciben con sobrepeso, incluso cuando están peligrosamente delgadas. Esta condición puede llevar a la desnutrición severa, con consecuencias graves para la salud física y mental. Es más común en adolescentes y mujeres jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona.



CAUSAS

- Genéticos: Predisposición hereditaria a los trastornos alimentarios.
- Psicológicos: Baja autoestima, perfeccionismo y trastornos de ansiedad.
- **Sociales y culturales:** Presión por alcanzar un ideal de belleza que promueve la delgadez.
- Familiares: Influencia de miembros que valoran en exceso la apariencia física o dinámicas familiares disfuncionales.
- Factores biológicos: Desequilibrios en neurotransmisores que afectan el comportamiento alimentario.

SÍNTOMAS

- 1. Restricción extrema de alimentos y evitar comer.
- 2. Pérdida de peso significativa y un peso corporal muy bajo.
- 3. Miedo intenso a ganar peso, incluso estando por debajo del peso saludable.
- 4. Distorsión de la imagen corporal, creyendo estar con sobrepeso cuando no es el caso.
- Comportamientos obsesivos relacionados con la alimentación, como contar calorías o realizar ejercicio excesivo.
- 6. **Problemas físicos** como piel seca, pérdida de cabello, fatiga, mareos, baja presión arterial y amenorrea (ausencia de menstruación en mujeres).
- 7. Aislamiento social, irritabilidad y depresión.

PRUEBAS Y EXÁMENES

El IMC es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso: bajo peso, peso saludable, sobrepeso, y obesidad. El IMC no mide la grasa corporal directamente, pero el IMC se correlaciona moderadamente con medidas más directas de la grasa corporal^{1,2,3}. Además, el IMC parece estar tan fuertemente correlacionado con diversos resultados metabólicos y de enfermedades como lo están estas medidas más directas de la grasa corporal.

¿Cómo se calcula el IMC?

$$IMC = \frac{Peso(Kg)}{Estatura(m)^2}$$

TRATAMIENTOS

- Terapia psicológica: Terapia cognitivo-conductual (TCC) para modificar patrones de pensamiento y comportamiento relacionados con la alimentación.
- Asesoramiento nutricional: Planes de alimentación diseñados por nutricionistas para restaurar un peso saludable.
- > Tratamiento médico: Supervisión médica para tratar complicaciones físicas como la desnutrición y desequilibrios electrolíticos.
- Medicamentos: Antidepresivos o ansiolíticos para tratar la depresión, ansiedad u otros trastornos mentales asociados.
- Hospitalización: En casos graves, la hospitalización puede ser necesaria para estabilizar el peso y tratar complicaciones graves.
- Terapia familiar: Involucra a los familiares en el proceso de recuperación para apoyar al paciente en su entorno.
- **Programas de rehabilitación:** Tratamientos intensivos en centros especializados para ayudar a la recuperación integral.


PROCESO DE AYUDA (COLUMNAS)

- 1. Detección y Concienciación
- 2. Evaluación y Diagnóstico
- 3. Plan de Tratamiento
- 4. Monitoreo y Ajuste del Tratamiento
- 5. Intervención en Crisis

- 6. Educación Nutricional y Alimentación Consciente
- Apoyo Psicosocial y Grupos de Ayuda
- 8. Rehabilitación Física
- 9. Prevención de Recaídas
- 10. Habilidades para la Vida

- 11. Empoderamiento y Recuperación de la Autoestima
- 12. Integración Social y Adaptación
- 13. Educación y Capacitación Familia.
- 14. Soporte Continuo y Asistencia Postratamiento

CASOS Y CONTROLES



EXPECTATIVAS

Con tratamiento adecuado, muchas personas pueden recuperarse por completo, pero algunas pueden enfrentar recaídas o complicaciones a largo plazo relacionadas con la salud física y mental.

"I'm starting to measure myself in strength, not in kilos. Sometimes in smiles." – Laurie Halse Anderson

País	Prevalencia en Mujeres (%)	Prevalencia en Hombres
		(%)
Japón	2.4%	Alto
Estados Unidos	0.9%-1.5%	Muy alto
Reino Unido	1.6%	Normal
Francia	1.2%	Bajo
Australia	1.0%	Alto

BIBILOGRAFÍA

Vuelve a la página de inicio

Lista de artículos