Informe del perfil de burbujas

FAND Resultado provisional de una partida 8/10/2026, 12:49:55

Importante: estas puntuaciones de 1 a 10 son una demostracion de como resumir los datos. El juego no tiene baremos ni puntos de corte validados y no diagnostica ni descarta ninguna neurodivergencia.

Resumen en palabras sencillas

La partida incluye ocho tareas: elegir un objetivo entre distractores, mantener la busqueda, distinguir tamanos, responder a una senal, frenar una respuesta, tocar un objetivo movil, cambiar de regla y repetir respuestas comparables. Cada resultado se refiere unicamente a la tarea indicada.

Resultados por capacidad

Capacidad para centrarse en el objetivo e ignorar estimulos parecidos. Se observa al elegir el panda entre otros animales.

Medida observada:
Elecciones correctas: 50 % (1 de 2); distractores tocados: 0; rondas omitidas: 0.

Capacidad para mantener la respuesta en una actividad continua. Se observan rondas repetidas durante 15 segundos y sus aciertos por intervalos.

Medida observada:
Respuestas correctas: 0 % (0 de 4). Por intervalos: 0 % (0 de 3); 0 % (0 de 1); No hubo intentos evaluables.

Capacidad para distinguir tamanos. Se observa al elegir la burbuja mas grande de cada grupo.

Medida observada:
Burbujas mayores elegidas correctamente: No hubo intentos evaluables.

Tiempo entre la aparicion de una senal y el toque. Tambien puede depender del dispositivo y de la familiaridad con la tarea.

Medida observada:
Tiempo mediano: Sin datos suficientes; respuestas validas: 0; senales sin respuesta: 0; anticipaciones: 0.

Capacidad para frenar una respuesta ante una senal de espera. Se cuentan las veces que se toca esa senal cuando la regla pide no tocarla.

Medida observada:
Senales ESPERA no tocadas: No hubo intentos evaluables; respuestas al panda: 0 de 0.

Coordinacion entre lo que se ve y el toque. Se observa la distancia al centro de un objetivo movil; requiere raton o pantalla tactil.

Medida observada:
Distancia media al centro: sin mediciones tactiles; objetivos tocados: 0 de 0; distractores tocados: 0.

Capacidad para adaptarse a una regla que cambia. Se alterna entre elegir la burbuja mayor y la menor.

Medida observada:

Reglas seguidas correctamente: No hubo intentos evaluables; rondas omitidas: 0.

Estabilidad de los tiempos en una tarea repetida. Se calcula con la variacion de los tiempos, no con su rapidez media.

Medida observada:
Tiempo mediano: Sin datos suficientes; variacion relativa del tiempo: sin datos suficientes; anticipaciones: 0.

Como se calculan las puntuaciones

Aciertos: 1 + 9 x proporcion correcta; se usa en las tareas de atencion, discriminacion, inhibicion y flexibilidad. Velocidad: 1 + 9 x (1 tiempo mediano / 2500 ms); 2500 ms es el limite de respuesta del juego, no un limite clinico.

Coordinacion: 1 + 9 x (1 distancia media al centro, limitada al 100 % del radio). Requiere al menos tres toques con coordenadas disponibles. Consistencia: 1 + 9 / (1 + variacion relativa de los tiempos); describe estabilidad, no rapidez.

Se necesitan al menos tres observaciones validas para mostrar una puntuacion. Sin datos suficientes no equivale a una puntuacion baja. Las formulas y tareas necesitan estudios de fiabilidad y validacion antes de interpretar rangos.

Que significa y que no significa

Una puntuacion mas alta indica mas aciertos, mas precision o mas estabilidad segun la formula de esa tarea. No significa que la persona tenga una capacidad normal ni que no presente dificultades cotidianas. No se asignan categorias de bajo, esperado o alto ni se compara con otras personas.

El dispositivo, la edad, la vision, la comprension de las instrucciones, el movimiento, la accesibilidad y la experiencia pueden influir. Los resultados no se guardan ni se envian automaticamente.

Cuando pedir orientacion?

Si hay dificultades persistentes que afectan al bienestar, el aprendizaje, el trabajo o las relaciones, puedes compartir el informe con pediatria, medicina de familia o un profesional de neurodesarrollo o salud mental. La decision requiere una valoracion mas amplia. Una partida aislada no permite recomendar ni descartar un diagnostico.