Informe del perfil de burbujas

FAND Resultado provisional de una partida 8/10/2026, 12:50:54

Importante: estas puntuaciones de 1 a 10 son una demostracion de como resumir los datos. El juego no tiene baremos ni puntos de corte validados y no diagnostica ni descarta ninguna neurodivergencia.

Resumen en palabras sencillas

La partida incluye ocho tareas: elegir un objetivo entre distractores, mantener la busqueda, distinguir tamanos, responder a una senal, frenar una respuesta, tocar un objetivo movil, cambiar de regla y repetir respuestas comparables. Cada resultado se refiere unicamente a la tarea indicada.

Resultados por capacidad

Atencion selectiva: 7.8 / 10

Capacidad para centrarse en el objetivo e ignorar estimulos parecidos. Se observa al elegir el panda entre otros animales.

Medida observada:
Elecciones correctas: 75 % (3 de 4); distractores tocados: 0; rondas omitidas: 0.

Atencion sostenida: 7.8 / 10

Capacidad para mantener la respuesta en una actividad continua. Se observan rondas repetidas durante 15 segundos y sus aciertos por intervalos.

Medida observada:
Respuestas correctas: 75 % (3 de 4). Por intervalos: 100 % (3 de 3); No hubo intentos evaluables; No hubo intentos evaluables.

Discriminacion visual: 7.8 / 10

Capacidad para distinguir tamanos. Se observa al elegir la burbuja mas grande de cada grupo.

Medida observada:
Burbujas mayores elegidas correctamente: 75 % (3 de 4).

Velocidad de respuesta: 9.7 / 10

Tiempo entre la aparicion de una senal y el toque. Tambien puede depender del dispositivo y de la familiaridad con la tarea.

Medida observada:
Tiempo mediano (las senales sin respuesta cuentan como 2200 ms): 80 ms; respuestas validas: 3; senales sin respuesta: 0; anticipaciones: 0.

Control inhibitorio: 10.0 / 10

Capacidad para frenar una respuesta ante una senal de espera. Se cuentan las veces que se toca esa senal cuando la regla pide no tocarla.

Medida observada:
Senales ESPERA no tocadas: 100 % (4 de 4); respuestas al panda: 0 de 0.

Coordinacion visomotora: 9.8 / 10

Coordinacion entre lo que se ve y el toque. Se observa la distancia al centro de un objetivo movil; requiere raton o pantalla tactil.

Medida observada:
Distancia media al centro: 2.0 % del radio; objetivos tocados: 3 de 4; distractores tocados: 0.

Flexibilidad cognitiva: 5.5 / 10

Capacidad para adaptarse a una regla que cambia. Se alterna entre elegir la burbuja mayor y la menor.

Medida observada:
Reglas seguidas correctamente: 50 % (2 de 4); rondas omitidas: 0.

Consistencia del rendimiento: 9.1 / 10

Estabilidad de los tiempos en una tarea repetida. Se calcula con la variacion de los tiempos, no con su rapidez media.

Medida observada:
Tiempo mediano: 55 ms; variacion relativa del tiempo (incluye senales sin respuesta como 2200 ms): 11.7 %; anticipaciones: 0.

Como se calculan las puntuaciones

Aciertos: 1 + 9 x proporcion correcta; se usa en las tareas de atencion, discriminacion, inhibicion y flexibilidad. Velocidad: 1 + 9 x (1 tiempo mediano / 2200 ms); las senales sin respuesta cuentan como 2200 ms. Ese es el limite de respuesta del juego, no un limite clinico.

Coordinacion: 1 + 9 x (1 distancia media al centro, limitada al 100 % del radio). Requiere al menos tres toques con coordenadas disponibles. Consistencia: 1 + 9 / (1 + variacion relativa de los tiempos); describe estabilidad, no rapidez.

Se necesitan al menos tres observaciones validas para mostrar una puntuacion. Sin datos suficientes no equivale a una puntuacion baja. Las formulas y tareas necesitan estudios de fiabilidad y validacion antes de interpretar rangos.

Que significa y que no significa

Una puntuacion mas alta indica mas aciertos, mas precision o mas estabilidad segun la formula de esa tarea. No significa que la persona tenga una capacidad normal ni que no presente dificultades cotidianas. No se asignan categorias de bajo, esperado o alto ni se compara con otras personas.

El dispositivo, la edad, la vision, la comprension de las instrucciones, el movimiento, la accesibilidad y la experiencia pueden influir. Los resultados no se guardan ni se envian automaticamente.

Cuando pedir orientacion?

Si hay dificultades persistentes que afectan al bienestar, el aprendizaje, el trabajo o las relaciones, puedes compartir el informe con pediatria, medicina de familia o un profesional de neurodesarrollo o salud mental. La decision requiere una valoracion mas amplia. Una partida aislada no permite recomendar ni descartar un diagnostico.