






HSC BIOLOGY

JAHID SIR- 01849625831

(Botany-Chapter 1)

Structure of DNA (DNA এর গঠন)



Deoxyribo Nucleic Acid এর সংক্ষিপ্তরূপ **DNA**. এটি ক্রোমোসোমের স্থায়ী এবং মৌলিক উপাদান। মার্কিন বিজ্ঞানী Watson এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী Crick ১৯৫৩ সালে DNA এর গঠন সম্পর্কিত একটি ভৌত মডেল প্রণয়ন করেন। মডেলটির নাম ডাবল হেলিক্স মডেল। এজন্য তারা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

Watson & Crick এর মডেল অনুযায়ী DNA এর ভৌত মডেল ব্যাখ্যা

১. DNA অনু দ্বি সূত্রক প্যাঁচানো সিঁড়ির মত, তাই বলা হয় ডাবল হেলিক্স(Double Helix)।
২. সিঁড়ির দুই পাশের রেলিং তৈরি হয় সুগার পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট **Deoxyribose** শৃঙ্খার এবং অজৈব ফসফেট (Pi) এর পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তি দ্বারা।
৩. সিঁড়ির দুই পাশের রেলিং এর মাঝখানের ধাপ তৈরি হয় একজোড়া নাইট্রোজিনাস ক্ষার (Base) দ্বারা।
৪. নাইট্রোজিনাস ক্ষার গুলোর সমজোড়া A=T, G=C.
৫. এখানে এডিনিন এবং থাইমিন এর মাঝে দুইটি এবং সাইটোসিন এবং গুয়ানিন এর মাঝে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে।
৬. ফসফেট যুক্ত থাকে **Deoxyribose** সুগারের ৩য় ও ৫নং কার্বনের সাথে এবং ক্ষারকগুলো যুক্ত থাকে **Deoxyribose** শৃঙ্খার ১ নং কার্বনের সাথে।
৭. DNA অনুর সূত্রক দুইটি উল্টা সমান্তরাল (Antiparallel)। অর্থাৎ একটি অপরটির বিপরীতমুখী হয়ে অবস্থান করে।
৮. DNA এর প্রতি ঘূর্ণনে ১০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে। এবং প্রতি ঘূর্ণনের দৈর্ঘ্য ৩৪Å°।
৯. প্রতি জোড়া নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব ৩.৪Å°।
১০. DNA অনুর ব্যাস সর্বদা ২০Å°। তবে প্রজাতিভেদে ভিন্ন হতে পারে।
১১. হেলিক্স এর প্রতিটি সম্পূর্ণ প্যাঁচ বা ঘূর্ণনের বাইরের দিকে একটি গভীর খাঁজ ও একটি অগভীর খাঁজের সৃষ্টি হয়।
১২. প্রতি ঘূর্ণনে হাইড্রোজেন মোট বন্ড সংখ্যা ২৫ টি।

DNA-র Replication বা অনুলিখন বা প্রতিলিখন বা দ্বিতন

কোষ বিভাজন সার্বিকভাবে DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। DNA নিজেই তার DNA সংশ্লেষ করে। সংখ্যাবৃদ্ধির সময় DNA বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে মাতৃ DNA অণুর অনুরূপ নতুন দুটি DNA অণু সৃষ্টি করে যেটি অনুলিখন বা প্রতিলিখন বা রিপ্লিকেশন বা দ্বিতন বা প্রতিলিপন সৃষ্টি নামে পরিচিত।

- **সংজ্ঞা :** যে প্রক্রিয়ায় একটি DNA ডাবল হেলিক্স থেকে একই রকম দুটি অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে DNA-র রিপ্লিকেশন বা অনুলিখন বলে।
- ইন্টারফেজের S Phase পর্যায়ে DNA-র অনুলিখন ঘটে।
- আদিকোষে DNA ছোটো এদের ১টি স্থানে অনুলিখন শুরু হয় এবং দ্রুত শেষ হয়।
- প্রকৃতকোষে DNA দীর্ঘ এদের সূত্রের বিভিন্ন স্থানে একই সাথে অনুলিখন শুরু হয় এবং অনুলিখনের গতিও কম।


Levinthal ও Crane (১৯৫৬) DNA অনুলিখনের তিনটি সম্ভাব্য ধরণ বা মডেল প্রস্তাব করেন।

1. সংরক্ষণশীল অনুকল্প
2. অর্ধসংরক্ষণশীল অনুকল্প
3. বিচ্ছুরণশীল অনুকল্প

মেসেলসন ও স্টাল (১৯৫৮), লেহম্যান ও অন্যায় (১৯৫৮), সয়েওকা (১৯৬০), জোর্জোভিথ (১৯৬০), কনবার্গ (১৯৬৭) প্রমুখের গবেষণায় **অর্ধসংরক্ষণশীল পদ্ধতির (Semi Conservative System)** অনুলিখনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

DNA অনুলিখনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও এনজাইমসমূহ :

- একটি ছাঁচ (টেমপ্লেট)
- অসংখ্য ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট (dATP, dGTP, dTTP, dCTP)
- নিউক্লিওটাইডের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টিতে ট্রাইফসফেটের শক্তি
- কিছু এনজাইম ও সহযোগী প্রোটিন (রিপলিকেশন কমপ্লেক্স)



Replication Complex

ক্রমিক	এনজাইম
০১	গাইরেজ (দু-প্রকার)
০২	হেলিকেজ
০৩	SSBP
০৪	প্রাইমেজ
০৫	পলিমারেজ-III
০৬	পলিমারেজ-I
০৭	লাইগেজ

Replication এর ধাপসমূহ:

১. উৎপত্তি স্থান শনাক্তকরণ

অনুলিপি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য DNA-র এক বা একাধিক স্থানে ক্ষারকজোড়া মুক্ত হয়ে বুদ্ধবুদ্ধের ন্যায় উৎপত্তিস্থল বা সূচনাবিন্দু (Replication origin=ori) সৃষ্টি করে (E-Coli এর ক্ষেত্রে বলা হয়) আর প্রকৃতকোষে এই স্থানকে Replicon বলা হয়। বুদ্ধবুদ্ধের এক প্রান্তে বা উভয় প্রান্তে ক্ষারকজোড় মুক্ত হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলেই বিচ্ছিন্ন DNA সূত্রদ্বয়কে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে অনুলিপনের সূত্রপাত হয়।

২. মাতৃ অণুর পাক-খোলা ও ক্ষারক সংযোগ মুক্তকরণ

হেলিকেজ এনজাইমের প্রভাবে ori বা Replicon স্থানের পাক খুলতে থাকে এবং হাইড্রোজেন বন্ধনী বিলুপ্ত হয়ে ক্ষারক জোড় ভেঙে DNA সূত্রক দুটি পৃথক হয়ে যায়। প্রতিটি সূত্রক নতুন সম্পূর্ণ সূত্রক তৈরির ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আদিকোষে টপোআইসোমারেজ এবং প্রকৃতকোষে গাইরেজ DNA এর নির্দিষ্ট অংশ কেটে দিয়ে অতিমাত্রায় প্যাঁচ থেকে মুক্ত করে।

৩. এক সূত্রক DNA ধরে রাখা

মুক্ত হওয়া DNA সূত্রক দুটি যাতে পুনরায় যুক্ত না হয় এজন্য SSBP (Single Strand Binding Protein) প্রতি সূত্রকের সাথে যুক্ত হয়ে সূত্রক দুটিকে পৃথক রাখে।

৪. অনুলিপি ফর্ক গঠন

Ori অঞ্চলের দুপাশে ক্ষারক জোড় খুলে অগ্রসর হওয়ায় সেখানে একটি Y-আকৃতির অনুলিপি ফর্ক তৈরি হয়। অনুলিপি একপ্রান্তে শুরু হলে ফর্ক একমুখী এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলে শুরু হলে ফর্ক দ্বিমুখী হয়। দ্বিমুখী ফর্কযুক্ত স্থানকে অনুলিপি চোখ বলে।

৫. সূচনা বিন্দুতে RNA প্রাইমার যুক্তকরণ

সূচনা বিন্দুতে RNA প্রাইমেজ এনজাইম একটি প্রাইমার RNA যুক্ত করে দেয়। DNA পলিমারেজ এনজাইম RNA প্রাইমারের মুক্ত 3'-OH অংশের সাথে একটি নিউক্লিওটাইড যুক্ত করে DNA সংশ্লেষণ শুরু করে।

৬. অপত্য DNA চেইন প্রলম্বন

অপত্য হেলিক্সের বৃদ্ধি হয় সবসময় 5'—3' অভিমুখে। কিন্তু পুরাতন হেলিক্সের স্ট্র্যান্ড দুটি তো একটি 5'—3' অন্যটি 3'—5'। তাই এদের সম্পূর্ণকে হওয়ার কথা 3'—5' এবং 5'—3'। এ কারণে পলিমারেজ এনজাইম নতুন দুটি স্ট্র্যান্ডে বিপরীতমুখী নিউক্লিওটাইড যুক্ত করে। নতুন সূত্রক দুটির মধ্যে একটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায় যাকে বলা হয় লিডিং সূত্রক। আর একটি ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায় যাকে বলা হয় ল্যাগিং সূত্রক। ল্যাগিং সূত্রকের অসম্পূর্ণ খন্ডগুলোকে ওকাজকি খন্ড বলে।

৭. ওকাজকি খন্ডের সংযোজন ও অনুলিপি সমাপ্তিকরণ

DNA পলিমারেজ-I এর সহায়তায় RNA প্রাইমারকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। ওকাজকি খন্ডের মাঝে ফাঁকা স্থানগুলো লাইগেজ এনজাইমের প্রভাবে সম্পূর্ণ নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আপত্য DNA অণু উৎপন্ন হয়। আপত্য DNA অণু দুটি পৃথক হয়ে গাইরেজ এনজাইমের প্রভাবে পুনরায় কুণ্ডলিত হয় এবং অনুলিপি সমাপ্ত হয়। এর পর রিপ্লিকেশন কমপ্লেক্স বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যায়।

৮. DNA প্রফ রিডিং ও মেরামত

আপত্য হেলিক্সে ছাঁচের বিপরীতে পরিপূরক নিউক্লিওটাইড সঠিকভাবে সংযুক্ত না হয়ে ভিন্ন নিউক্লিওটাইড যুক্ত হতে পারে, রিপ্লিকেশন এর সময় প্রতি ১০০০ জিন এর মধ্যে ১ টি ভুল হতে পারে একে মিসম্যাচ বলে। অথবা পরিবেশীয় প্রভাবক (UV-ray) DNA-তে ক্ষত সৃষ্টি করে। এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধনের ব্যবস্থাও আছে। DNA পলিমারেজ এর কিছু প্রোটিন রিপেয়ার কমপ্লেক্স গঠন করে স্ট্র্যান্ড ধরে অগ্রসর হয় এবং কোন ভুল থাকলে সংশোধন করে দেয়।

ট্রান্সক্রিপশন


প্রোটিন সংশ্লেষণের আগে কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতর DNA অনুর একটি সূত্রকে ছাঁচ হিসাবে কাজে লাগিয়ে যে প্রক্রিয়ায় mRNA সূত্রের প্রতিলিখন ঘটে তাকে ট্রান্সক্রিপশন বলে।

DNA অনুর যে সুনির্দিষ্ট অংশটি এনজাইম উৎপন্নের উদ্দেশ্যে mRNA সৃষ্টির ছাঁচ হিসাবে কাজ করে সে অংশের নাম জিন।

ট্রান্সক্রিপশনের কাঁচামাল

- DNA Template বা ছাঁচ
- RNA Polymerase Enzyme
- মূক্তরাইবোনিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট
- কিছু সহযোগী প্রোটিন

প্রোটিন সংশ্লেষে সমগ্র ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াকে নিচে বর্ণিত ৩টি পর্বে ভাগ করে বর্ণনা করা হয়ে থাকে;




1. **সূচনাঃ** প্রত্যেক জিনে দ্বিসূত্রক DNA র একটি সূত্র প্রতিলিপিত হয় যা নন কোডিং/টেমপ্লেট এবং অন্যটি কোডিং/নন টেমপ্লেট। নিউক্লিওটাইডের একটি স্টার্ট ও এন্ড পয়েন্ট থাকে (sequence)। RNA পলিমারেজ যেখানে যুক্ত হয় সেটি প্রমোটার অঞ্চল। প্রমোটারের সঙ্গে RNA পলিমারেজের বন্ধন হলো সূচনা পর্বের প্রথম ধাপ। ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর নামক প্রোটিন সমষ্টি RNA পলিমারেজের বন্ধন ও ট্রান্সক্রিপশন সূচনায় মধ্যস্থতা করে। প্রমোটারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এর প্যাঁচ খুলে দিয়ে টেমপ্লেট সূত্রে ৩'-৫' প্রান্ত ধরে RNA সৃষ্টির সূচনা করে।
2. **প্রলম্বনঃ** RNA পলিমারেজ DNA হেলিক্সের প্রায় ১০-১২ টি বেস জোড় খুলে দেয় এবং ৩'-৫' মূখী টেমপ্লেট সূত্রের পরিপূরক নতুন নতুন মুক্ত নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে একটি বর্ধনশীল সূত্রে যোগ হতে থাকে। যে বেসটি উৎপন্ন হয় সেটি ৫' মূখী প্রান্তের সৃষ্টি করে অন্যদিকে নির্ধারিত দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ৩' প্রান্তে নতুন বেস যোগ হতে থাকে। এ সময় RNA পলিমারেজের প্রভাবে মুক্ত নিউক্লিওটাইড ভান্ডার থেকে mRNA-র সূত্রের জন্য অ্যাডেনিনের পরিপূরক হিসাবে ইউরাসিল বেসবাহী নিউক্লিওটাইড সংগৃহীত ও যুক্ত হয়।
3. **সমাপনঃ** DNA সূত্রে অবস্থিত বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুক্রমে গঠিত একটি সমাপন অঞ্চল থাকে। mRNA সূত্র সংশ্লেষিত ও লম্বা হলে এক পর্যায়ে সমাপন অঞ্চলে এসে পৌঁছায়। সমাপ্তি অনুক্রম RNA পলিমারেজ কে DNA এর প্রতিলিখন থেকে বিরত রাখে এবং RNA পলিমারেজ DNA সূত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে mRNA অনু মুক্ত হয়। এভাবে অল্প সময়ে হাজার হাজার mRNA অনু এবং একই প্রোটিনের অসংখ্য কপি সৃষ্টি হয়।

ট্রান্সলেশন(Translation)

mRNA থেকে সংকেত অনুযায়ী অ্যামিনো অ্যাসিড পর্যাক্রমিকভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে পলিপেপটাইড চেইন সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে ট্রান্সলেশন বলে।

ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উপাদান :

১. মুক্ত বা অঙ্গাণুর গায়ে আবদ্ধ রাইবোসোম। 70S বা 80S।
২. mRNA (প্রোটিন সংশ্লেষনের ছাঁচ)
৩. বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড
৪. tRNA (অ্যামিনো অ্যাসিড বহনকারী)
৫. অ্যামিনো অ্যাসাইল tRNA সিন্থেটেজ, বিভিন্ন এনজাইম, কো-এনজাইম এবং ATP।



ট্রান্সলেশন এর দিক →

চিত্র: ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া

ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার প্রধান অঙ্গাণু রাইবোসোম। অনেক সময় একাধিক রাইবোসোম গুচ্ছবদ্ধভাবে একই mRNA দ্বারা ট্রান্সলেট করতে থাকে তখন পলিরাইবোসোম বলে। রাইবোসোমের কাজ হলো mRNA, tRNA ও সংশ্লিষ্ট এনজাইমগুলোকে পেপটাইড বন্ড সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সঠিক স্থানে ধরে রাখা।

ধাপ:

১. অ্যামিনো অ্যাসাইল সিস্টেটেজ-এর প্রভাবে সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ATP-র সাথে যুক্ত হয়ে সক্রিয় হয় এবং সংশ্লিষ্ট tRNA-র 3' প্রান্তের সাথে সংযুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে।
২. রাইবোসোমের ছোটো উপ-এককের সাথে mRNA সর্বপ্রথম যুক্ত হয়। রাইবোসোমের ৩টি স্থান থাকে, এদের যথাক্রমে A-সাইট এবং P-সাইট, E-সাইট বলে। mRNA প্রথমে রাইবোসোমের ছোট উপএককের সাথে যুক্ত হয় এবং এরপর বড় উপএকক যুক্ত হয়। মেথিওনিনবাহী tRNA রাইবোসোমের প্রথমে P সাইটে যুক্ত হয়। পরবর্তি অ্যামিনো এসিডবাহী tRNA রাইবোসোমের A সাইটে এসে বসে।
৩. রাইবোসোমের মধ্যে mRNA-র 5' প্রান্ত প্রথম অনুপ্রবেশ করে সেখানে প্রারম্ভিক কোডন (AUG) এর সাথে tRNA এর UAC অ্যান্টিকোডন-এর সংযুক্তি ঘটে।
৪. mRNA ক্রমান্বয়ে (5'→3') রাইবোসোমের A-সাইট হতে P-সাইটে অতিক্রম করতে থাকে। একই সাথে কোডনের সাথে মিল রেখে অ্যান্টিকোডনবাহী tRNA অ্যামিনো অ্যাসিড যৌগ এক এক করে রাইবোসোমের A-সাইটে আসতে থাকে।
৫. A-সাইট ও P-সাইটের পাশাপাশি দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড পলিপেপটাইড বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডসহ tRNA A-সাইট হতে P-সাইটে গিয়ে বন্ধনী গঠন করে E site দিয়ে পুনরায় tRNA মুক্ত হয়।
৬. mRNA-র শেষে সমাপ্তি কোড (UAA, UAG, UGA) রাইবোসোমে A-সাইটে পৌঁছালে নতুন tRNA হাজির না হয়ে সমাপ্তিকরণ দ্রব্য (F₁) যুক্ত হয় এবং পলিপেপটাইড সংশ্লেষণ বন্ধ হয়।
৭. পলিপেপটাইড অণু ও mRNA রাইবোসোম ত্যাগ করে এবং রাইবোসোমের দুটি উপ-একক পৃথক হয়ে যায়।

DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	DNA	RNA
১। ভৌত গঠন	দ্বিসূত্রক, প্যাঁচানো বা ঘুরানো সিঁড়ির মতো।	একসূত্রক, শিকলের ন্যায়।
২। রাসায়নিক গঠন	(i) এতে থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার এবং (ii) DNA-এর পাইরিমিডিনে থাইমিন ও সাইটোসিন বেস থাকে।	(i) এতে থাকে রাইবোজ শ্যুগার এবং (ii) RNA-এর পাইরিমিডিনে ইউরাসিল ও সাইটোসিন বেস থাকে।
৩। প্রকার	DNA-অণুর কোনো প্রকারভেদ নেই। কার্যগত দিক হতে DNA-একই রকম হয়।	কার্যগত দিক হতে RNA পাঁচ প্রকার। যথা- tRNA, rRNA, mRNA, gRNA, মাইনর RNA।
৪। উৎপত্তি	প্রতিলিপনের মাধ্যমে নতুন DNA সৃষ্টি হয়।	নতুনভাবে RNA সৃষ্টি হয়। কোনো প্রতিলিপন হয় না।
৫। অবস্থান	প্রধানত ক্রোমোসোমে থাকে। সামান্য পরিমাণ মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টেও থাকে।	ক্রোমোসোম, সাইটোপ্লাজম, রাইবোসোম ও নিউক্লিওলাসে থাকে।
৬। প্রধান কাজ	বংশগতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা।	প্রোটিন সংশ্লেষ করা।
৭। বংশগতি	DNA বংশগত চরিত্র বহন করে।	ভাইরাল RNA ছাড়া বংশগত চরিত্র বহন করে না।
৮। সংখ্যা	এতে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা অনেক বেশি।	এতে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা অনেক কম।
৯। অতিবেগুনি রশ্মি	অধিক পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।	তুলনামূলকভাবে কম অতিবেগুনি রশ্মি শোষিত হয়।
১০। আণবিক ওজন	এদের আণবিক ওজন দশ লক্ষ হতে বহু কোটি ডাল্টন পর্যন্ত হয়।	এদের আণবিক ওজন কয়েক লক্ষের বেশি হয় না।