

Formanyomtatvány

MU-KK-01.6.1.5. F03	
Változat:	
	02
Kiadva:	2018.07.02.
Oldal:	1/1

Beteg-hazabocsátási tájékoztató

Hazabocsátási tájékoztató transzfúziós kezelésen (vérátömlesztésen) átesett beteg számára a lehetséges szövődményekről*.

SZTE SZAKK (egység)	

Tisztelt Betegünk!

Orvosa javaslata szerint Ön vért kapott. Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy az alábbi tünetek némelyike jelentkezik a transzfúzió alatt vagy akár néhány héttel azt követően:

- · sárgaság;
- feltűnő sápadtság, fáradság;
- sötét vagy piros vizelet;
- vizeletelakadás;
- nehézlégzés, mellkasi fájdalom, hátfájdalom;
- csalánkiütés, bőrkiütés;
- láz, remegés, hidegrázás.

Amennyiben a fenti tünetek valamelyikét észleli, feltétlenül keresse fel orvosát!

A transzfúzió után jelentkező egyéb tünetek nem mindig a transzfúzióhoz kapcsolódnak, de fontos, hogy ha állapota váratlanul romlik, azonnal értesítse orvosát.

Napközben Drt, ügyeleti időben vagy hétvégén
a(z) osztály ügyeletes orvosát.
Telefon:

Ambuláns transzfúzió esetén is!