

BETEGTÁJÉKOZTATÓ BÓDÍTÁSHOZ

Beteg neve: Szül.:

TAJ szám:

Tisztelt Betegünk!

Az endoszkópos vizsgálatok előtt, amennyiben ezt állapota megengedi, és Ön a betegtájékoztató elolvasása után úgy dönt, mód van a vizsgálat bódításban történő elvégzésére.

A gyógyszer hatása nagy egyéni különbségeket mutat, mely miatt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi részletes tájékoztatót a készítmény alkalmazásának lehetőségéről, hatásáról és mellékhatásairól.

Az alkalmazásra kerülő készítmény: Dormicum (1 ampulla 5 mg midazolamot tartalmazó) intravénás injekció egy benzodiazepin-származék (altató, nyugtató hatású).

A vizsgálat előtt vénás kanül (Branül) kerül beültetésre, melyet távozása előtt fogunk eltávolítani. A vizsgálat alatt a bódított beteg folyamatos ellenőrzése történik (oxigén ellátottság, pulzusszám mérés).

Az endoszkópos beavatkozás előtt a készítmény csak akkor alkalmazható, ha az esetleges szövődményként jelentkező légzésleállás esetén újraélesztésre lehetőségünk van. Az utolsó dózis beadás után minimum 3 órával tudjuk elbocsátani intézetünkéből, megfelelő kísérelvel. Vegye figyelembe, hogy 12 óráig nem vezethet járművet, nem kezelhet gépeket és nem fogyaszthat alkoholt.

A Dormicum alkalmazása intravénásán történik. Az endoszkópos vizsgálat előtt 5 perccel 2,5 mg-ot kap, lassan 10 másodperc alatt. Szükség esetén további 1 mg-os dózisokat lehet adni. A gyógyszer a beadás után 2 perccel kezd hatni.

Speciális esetekben (vérvolumen csökkenés, érszűkület, kihűlt állapot, idős kor) az adag kisebb mennyisége kerül alkalmazásra. Az idős, leromlott állapotú betegeknek a kezdő adag 1-1,5 mg, az összes dózis 3,5 mg lehet.

Nem adható a készítmény, ha: Túlérzékenység áll fenn valamely összetevőre. Súlyos légzési elégtelenség van jelen. Terhességben az első három hónapban.

Fokozott óvatosság (kisebb dózis) szükséges: Kiszáradásban, szívelégtelenségben, elégtelen máj- és veseműködésben, érelmeszesedésben, légzéscsökkentésben, fokozott agynyomás esetén, epilepszia, miaszténia gravis, agyi ér lézió, fejsérülés, esetén, agydaganat, gyógyszerfüggőség, krónikus alkoholizmus, idős kor (60 év felett) esetén.

Mellékhatások (előfordulhatnak): Memóriazavar, bőrreakciók (kiütés, bőrvizketés), álmoság, csökkent éberség. Zavartság, eufória, fáradtság, fejfájás, szédülés, járásbizonytalanság. Pszichés izgatottság, remegés, hiperaktivitás, ellenségesség, dühkitörés, agresszivitás. Görcs- roham, hányinger, hányás, szájszárazság, székrekedés, csuklás, fulladás. Légzésmegállás, vérnyomás-csökkenés, szívdobogásérzés, alacsony pulzusszám, gégegörcs, fájdalom az injekció helyén, thrombosis, kettős látás. A legsúlyosabb lehetséges szövődmény a légzésleállás.

Óvatosan együtt adható a Dormicum: Antidepresszánsokkal (Melipramin, Anafranil, Saplent, Ludiomil), pszicholeptikum (Tisercin, Haloperidol, Ketilept, Olanzapin, Tiapridal, Risperdal) pszichoanaleptikum (Piracetam, Lucetam, Cavinton), szerekkel, görcsoldókkal és antipszichotikumokkal (Xlomomx, Haloperidol), anxiolitikumokkal, altatók és nyugtatók szedése után.

Fokozzák a Dormicum központi idegrendszeri nyugtató hatását a következő gyógyszerek: Histodil inj. és tabl., Erythrotrop granulátum és szirup, Meromycin-Ratiopharm ftabl. Cidoclarftabl., Cfarithromycin I a Pharma ftabl., Clanthromycin-ratiopharm ftabl. Clarithromycin-teva tabl., Fromilid ftabl., Uno retard ftabl., Klabax ftabl., granulátum Klacid ftabl., Klari UNO ret.ft., gran., por., Klarigen ftabl., Klarilid tabl., Lekoklar ftabl.

Fokozzák a hatást, mert csökkentik az ürülését (clearance-ét): Sandimmun és Neoral ivóamp., kapsz., konc. infúzió., Cordarone inj., Cordarone tabl.

Felezési ideje megnyúlik és elhúzódik a szedatív hatás: Chinopamil retard kapsz., Isoptin ftabl., SR retard ftabl., inj. Verapamil AL ftabl., retard tabl., Verapamil drg. és inj., Blocalcin tabl., retard tabl., Dilrene retard kapsz., Dilzem retard tabl. sedése esetén.

Óvatosság indokolt a központi idegrendszer depresszánsainak szedése esetén: Sevalnal tbl., Sevenaletta tbl., Ópioidok (fájdalomcsillapítók), Ópioid érzéstelenítők, Ópium alkaloidok és származékaik (köhögéscsillapítók.)

Mellékhatás, túladagolás, mérgezés:

A benzodiazepinek (Dormicum - midazolam) túladagolása általában nem jelent közvetlen életveszélyt, csak akkor, ha egyéb központi idegrendszeri depresszáns gyógyszerrel vagy alkohollal kombinált mérgezés áll fenn.

A túladagolás tünetei: Általában a gyógyszerhatás felerősödése figyelhető meg: álmoság, zavartság, letargia, izomrelaxáció, paradox exitáció, súlyosabb esetekben areflexia, hipotónia, apnoe, coma, cardiorespiratorikus depresszió.

Kezelése: Folyamatos megfigyelésben részesül, melynek fontos része a keringés és a légzési funkciók támogatása. Súlyos, komával vagy légzésdepresszióval járó esetben a Dormicum ellenszere (antagonistája) a flumazenil (Anexate inj.) intravénás alkalmazására szükség lehet. A flumazenil adását követően Ön további szoros megfigyelésre szorul, mert a még keringésben maradó Dormicum hatásának időtartama meghaladhatja az ellenszerként beadott flumazenil hatástartamát. Flumazenilt nem kap, ha EKG abnormalitás van jelen (QRS vagy QT megnyúlás), továbbá ha triciklikus antidepresszívumokat, vagy epileptogén készítményeket szed.

Nyilatkozat

A Betegtájékoztatóban leírtakat megértettem. Vizsgáló orvosomat tájékoztatom, hogy a következő gyógyszereket használom:

Endoszkópos vizsgálatom során kérem a Dormicum iv. injekció alkalmazását:

Dátum: _____

beteg aláírása

orvos aláírása