

	Melléklet	MU-KK-01.6.1.5. M01
		Változat: 01
Betegtájékoztató vérátömlesztés esetén	Kiadva: 2018.07.02.	
	Oldal: 1 / 1	

Tisztelt Betegünk!

A vérátömlesztés célja, lényege:

A vérátömlesztés - azaz emberi vérből előállított vérkészítmény adása - az Ön gyógyulása érdekében szükséges. A vérátömlesztés során más ember(ek)től levett, a szakmai szabályok szerint kivizsgált, előállított és tárolt vérkészítményt juttatunk az Ön szervezetébe. A vérkészítmény lehet teljes vér vagy vér alkotórész.

A vérátömlesztésre azért van szüksége, mert az Ön szervezetében az életét veszélyeztető mértékben kevés van valamelyik alkotórészből – vörösvérsejt, vérplazma, vérlemezke - és azt más módon pótolni (pl. gyógyszerrel) jelenleg nem lehet.

A hiány oka lehet, hogy az Ön szervezetében a hiányzó alkotóelem(ek) termelése nem elégséges vagy azok fokozottan pusztulnak.

Az Ön számára szükséges vérkészítmény típusát és mennyiségét a kezelőorvosa határozza meg.

A vérátömlesztéshez szükséges előkészületek során kezelőorvosa különböző vizsgálatokat fog elvégeztetni, hogy a vérátömlesztés a lehető legnagyobb biztonságban történjen.

A vérátömlesztés esetén speciális gyógyszerelés általában nem szükséges. Amennyiben Önnél mégis szükség van gyógyszeres kezelésre a vérátömlesztés kapcsán, akkor arról kezelőorvosa részletesen tájékoztatni fogja.

A vérátömlesztés előtt kezelőorvosa személyre szabott szóbeli tájékoztatást is ad Önnek. Kérdéseivel forduljon hozzá bizalommal!

A tájékoztatást követően Önnek írásos beleegyező nyilatkozatot kell kitöltenie a beavatkozással kapcsolatban. Amennyiben a kórházi bennfekvése során Ön több alkalommal szorul vérátömlesztésre, akkor a beleegyező nyilatkozat a teljes kórházi bennfekvésre, a többszöri vérátömlesztésre is érvényes, nem kell azt minden vérkészítmény beadása előtt megismételnie. Nyilatkozatát bármikor következmény nélkül visszavonhatja.

Lehetséges szövődmények

A beavatkozás az előnyök mellett hátrányokkal is járhat az egészségügyi állapotra vonatkozóan. A bevitt idegen sejtek sohasem azonosak teljes mértékben a sajátjával, ezért azokat a szervezet, elsősorban lázzal, veseműködési zavarokkal, allergiás bőrjelenségekkel és más szövődmények kíséretében kivetheti magából, annak ellenére is, hogy a vérátömlesztés előtt előírt, szabályszerűen elvégzett előzetes laboratóriumi vizsgálatok során erre a lehetőségre az eredmények nem utalnak. Ennek tényleges valószínűsége jelenlegi ismereteink szerint 1% alatt van.

A vérátömlesztéssel a kötelezően előírt szűrővizsgálatok (HBsAg, a-HBc, a-HCV, a-HIV 1-2, Syphilis) negatív eredménye ellenére a fertőzés, elsősorban fertőző májgyulladás kórokozójának átvitele teljes biztonsággal nem zárható ki. Ennek tényleges valószínűsége a jelenlegi ismereteink szerint százezer vérátömlesztésből legfeljebb egy.

Teendők a vérátömlesztést követően

A transzfúzió után jelentkező egyéb tünetek nem mindig a transzfúzióhoz kapcsolódnak, de fontos, hogy ha állapota váratlanul romlik, azonnal értesítse orvosát!

Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy az alábbi tünetek némelyike jelentkezik a transzfúzió alatt vagy akár néhány héttel azt követően:

- sárgaság;
- feltűnő sápadtság, fáradtság;
- sötét vagy piros vizelet;
- vizeletelakadás;
- nehézlégzés, mellkasi fájdalom, hátfájdalom;
- csalánkiütés, bőrkirritás;
- láz, remegés, hidegrázás.

Amennyiben a fenti tünetek valamelyikét észleli, feltétlenül keresse fel orvosát!

Felhívjuk figyelmét, hogy a vérátömlesztést követő 180 napban Ön nem lehet véradó donor!