

ПРАКТИЧЕСКИЙ ГАЙД ШКОЛЫ «АТЛАС»

7 техник *самопомощи* при тревоге

Короткие, проверенные упражнения из КПТ, АСТ и практик осознанности — чтобы возвращаться в равновесие за 1–15 минут.

Как пользоваться гайдом

Тревога — естественная реакция психики на неопределённость. Она помогала нашим предкам выживать, но в современном мире часто включается там, где реальной опасности нет: перед звонком, во время новостей, ночью перед важным днём.

В этом гайде собраны семь техник с доказанной эффективностью — из когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), терапии принятия и ответственности (АСТ) и практик осознанности. Каждая занимает от одной до пятнадцати минут.

Не нужно осваивать всё сразу. Выберите одну-две техники, которые откликаются, и практикуйте их каждый день в течение недели. Навык регуляции формируется повторением, а не силой воли.

01	Дыхание 4-7-8	2 минуты
02	Заземление 5-4-3-2-1	1–3 минуты
03	«Час тревоги»	15–20 минут в день
04	Прогрессивная мышечная релаксация	10–15 минут
05	Дневник автоматических мыслей	10 минут
06	Позиция наблюдателя	3–5 минут
07	Пауза самосострадания	2 минуты



Регуляция нервной системы

2 минуты

Дыхание 4-7-8

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Острая волна тревоги, трудно уснуть, перед важным событием.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Удлинённый выдох активирует блуждающий нерв и парасимпатическую нервную систему — ту, что отвечает за восстановление. Пульс замедляется, мышцы расслабляются.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

- 1 Сядьте удобно, положите кончик языка за верхние зубы.
- 2 Сделайте полный выдох через рот.
- 3 Вдохните носом на 4 счёта.
- 4 Задержите дыхание на 7 счётов.
- 5 Медленно выдохните через рот на 8 счётов.
- 6 Повторите 4 цикла. Со временем можно увеличить до 8.

Совет. Если задержка на 7 даётся тяжело, сократите все фазы пропорционально — важно соотношение, а не длительность.



Осознанность

1–3 минуты

Заземление 5-4-3-2-1

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Ощущение нереальности, паническая атака, «уносит» в мысли.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Техника переключает внимание с внутренних катастрофических сценариев на сенсорный опыт настоящего момента. Мозгу сложно одновременно сканировать окружение и раскручивать тревогу.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

- 1 Назовите про себя 5 вещей, которые вы видите.
- 2 4 вещи, которые можете потрогать — и прикоснитесь к ним.
- 3 3 звука, которые слышите.
- 4 2 запаха (или вспомните два любимых).
- 5 1 вкус, который ощущаете прямо сейчас.

Совет. Называйте предметы подробно: не «стол», а «светлый деревянный стол с царапиной у края».



КПТ · контроль стимулов

15–20 минут в день

«Час тревоги»

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Навязчивое беспокойство, которое возвращается в течение всего дня.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Исследования показывают: если откладывать беспокойство на определённое время, общее количество тревожных мыслей снижается. Вы не запрещаете себе тревожиться — вы назначаете для этого место.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

- 1 Выберите ежедневное время и место, например 19:00 за кухонным столом.
- 2 Днём, заметив беспокойную мысль, коротко запишите её и скажите себе: «Подумаю об этом в 19:00».
- 3 В назначенное время 15–20 минут разберите записи.
- 4 Для каждой мысли спросите: могу ли я на это повлиять? Если да — запишите первый шаг. Если нет — отпустите.
- 5 Когда время вышло, переключитесь на приятное занятие.

Совет. Не проводите «час тревоги» прямо перед сном.



Метод Джекобсона

10–15 минут

Прогрессивная мышечная релаксация

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Хроническое напряжение в теле, зажатые плечи, проблемы со сном.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Тревога и мышечное напряжение поддерживают друг друга. Сознательно напрягая и отпуская группы мышц, вы научитесь замечать напряжение и снимать его.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

- 1 Лягте или сядьте удобно, закройте глаза.
- 2 Сожмите кулаки на 5–7 секунд, заметьте напряжение.
- 3 Резко отпустите и 20 секунд замечайте разницу.
- 4 Повторите для предплечий, плеч, лица, шеи, живота, бёдер, икр и стоп.
- 5 В конце сделайте несколько спокойных вдохов, почувствуйте тело целиком.

Совет. Напрягайте мышцы примерно на 70% — без боли.



КПТ · когнитивная реструктуризация

10 минут

Дневник автоматических мыслей

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Тревога связана с конкретной ситуацией, есть ощущение «точно случится плохое».

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Между событием и нашей реакцией всегда есть мысль. Записывая её, мы получаем возможность проверить её на реалистичность вместо того, чтобы автоматически ей верить.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

- 1 Ситуация: что произошло? Только факты.
- 2 Мысль: что пронеслось в голове? Запишите дословно.
- 3 Эмоция: что вы почувствовали и насколько сильно (0–100%)?
- 4 Доказательства «за» и «против» этой мысли.
- 5 Альтернативная, более сбалансированная мысль.
- 6 Переоцените силу эмоции (0–100%).

Совет. Цель — не «позитивное мышление», а реалистичное.

АСТ · когнитивная дефузия

3–5 минут

Позиция наблюдателя

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Навязчивые «а что если...», мысли кажутся абсолютной правдой.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Мысли — это события в уме, а не факты. Дефузия помогает создать дистанцию: вы перестаёте «быть» тревожной мыслью и начинаете её замечать.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

- 1 Заметьте тревожную мысль, например: «Я не справлюсь».
- 2 Добавьте к ней фразу: «Я замечаю, что у меня есть мысль, что я не справлюсь».
- 3 Представьте, что мысль написана на листе, который плывёт по реке.
- 4 Позвольте ей уплыть, не отталкивая и не удерживая.
- 5 Верните внимание к тому, что важно сейчас.



Метод Кристин Нефф

2 минуты

Пауза самосострадания

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Самокритика, стыд, ощущение «со мной что-то не так».

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Самокритика активирует систему угрозы, а самосострадание — систему заботы и безопасности. Исследования связывают его с меньшим уровнем тревоги и депрессии.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

- 1 Признайте: «Сейчас мне тяжело. Это момент страдания».
- 2 Напомните себе: «Трудности — часть жизни любого человека. Я не один(а)».
- 3 Положите руку на сердце и скажите: «Пусть я буду добр(а) к себе».
- 4 Спросите себя: что мне нужно прямо сейчас?

Совет. Если фразы кажутся неестественными, подберите свои — так, как вы утешали бы близкого друга.

Когда стоит обратиться к специалисту

Техники самопомощи эффективны при повседневной тревоге, но не заменяют работу с психологом или врачом. Обратитесь за помощью, если:

- тревога мешает работать, учиться или общаться дольше двух недель;
- появились панические атаки или вы избегаете привычных мест и ситуаций;
- нарушились сон и аппетит;
- появились мысли о том, что жить не хочется.

Если вам очень тяжело прямо сейчас, обратитесь за бесплатной помощью: Московская служба психологической помощи — 051 (с мобильного +7 495 051), Детский телефон доверия — 8-800-2000-122. При угрозе жизни звоните 112.

Тревога не исчезает за один день, но с каждым днём практики вы всё увереннее возвращаетесь в равновесие. Если хотите пройти этот путь с поддержкой психолога и группы — приходите на программу «Тревога под контролем».

Откройте приложение «Атлас» в Telegram: практики, задания и персональные скидки на программы школы.