LTL

$Ac = \{ chop, \text{[illegible]}, idle \}$.

$\Pi = \{ up, down \}$



$f \triangleright \varphi$

UP 1

$\varphi = \Box \bigwedge_{a \in Ac} [a \rightarrow \bigwedge_{b \neq a \in A} \neg b]$

$\wedge$

$\Box (\quad \rightarrow \quad F1)$

$\wedge$

$\Box (\bigwedge_{f \in F1} f \wedge idle \rightarrow \bigcirc f)$

$\wedge$

$\Box (down \wedge chop \rightarrow \bigcirc down)$

$\wedge$

$\Box (up \wedge chop \rightarrow \bigcirc (up \vee down))$

projection of observations

$\wedge$

$\Box \Diamond chop \rightarrow \Diamond down$

g_i = "freight i"

steel tree X

imp

P'



P'

"$\Box \Diamond chop \rightarrow \Diamond down$"









↳


$O_1 a_1 O_2 a_2 \xrightarrow{g} O$
$g : H \to O$
$\Phi \subseteq P'$
O, A
P
POD
$\to \alpha(P)$
POND
$(O, A, o \xrightarrow{a} o' \in P_i, \exists_i, T)$
P'
$\exists \Phi$ st.
P_1
P_2
$\in P_i$ runs with μ
$(1) \forall i, P_i \models A \Phi$ ✓
(2) sound.
$\forall \mu : O^* \to A$
P_i
μ
$P \models \Box T$
μ solves P_i', V_i'
$\Uparrow \checkmark$ wrt (1)
μ solves P' wrt Φ i.e.,
P'
μ
$\in P'$
π
$s_0 \to O_0$
$a_0 \quad a_0$
$s_1 \to O_1$
$a_1 \quad a_1$
$s_2 \to O_2$
$a_2 = a_2$
$s_3 \to O_3$.
μ
$\pi \models \Phi \to \Box T$.
$\pi \in (O, A)^\omega$