

УТВЕРЖДАЮ

Директор
КГП «Областная клиническая
больница» управления
здравоохранения Карагандинской
области

К.Т.Абдрахманов
« 05 » 2016 г.



Список резервных антибактериальных средств и показания к их применению

Название препарата	Показания к применению
Цефтазидим/авибактам (Ксавитаз, Завицефта)	Тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, осложненные ИМП, осложненные интраабдоминальные инфекции, сепсис/бактериемия, фебрильная нейтропения, тяжелые инфекции у пациентов инфекционного центра при выделении чувствительных <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i> и других грамотрицательных бактерий.
Колистин (Колигод, Кометад)	Тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, ИМП, сепсис/бактериемия, инфекции ЦНС, инфекции у пациентов ОРИТ и инфекционного центра при выделении чувствительных мультирезистентных <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter spp.</i> , <i>Citrobacter spp.</i> , <i>Escherichia coli</i> и других грамотрицательных бактерий, при отсутствии эффективных альтернатив.
Линезолид (Линозид, Амизолид)	Тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, осложненные инфекции кожи и мягких тканей, сепсис/бактериемия, вызванные чувствительными грамположительными бактериями (<i>MRSA</i> , <i>VRE</i> , <i>Streptococcus spp.</i>), когда применение ванкомицина невозможно или к нему определена резистентность.
Пиперациллин/тазобактам (Ревотаз, Tazopir)	Инфекции нижних дыхательных путей, осложненные ИМП, интраабдоминальные инфекции, инфекции кожи и мягких тканей, костей и суставов, гинекологические инфекции, сепсис/бактериемия, фебрильная нейтропения при выделении чувствительных Гр+, Гр- и анаэробных микроорганизмов, включая <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .
Тигециклин (Тайген)	Осложненные инфекции кожи и мягких тканей, осложненные интраабдоминальные инфекции, внебольничная пневмония, тяжелые инфекции, вызванные чувствительными мультирезистентными <i>MRSA</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Enterobacterales</i> (в т.ч. БЛРС-продуценты) и анаэробами. <u>Не применять при инфекциях, вызванных <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Proteus spp.</i>, <i>Morganella morganii</i> и <i>Providencia spp</i></u>

Антибиотики резерва следует назначать по результатам микробиологического исследования и определения чувствительности возбудителя, с согласованием с клиническим фармакологом (при наличии) и/или решением консилиума.

БЕКІТІЛДІ
Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының
«Облыстық клиникалық ауруханасы» КМК директоры
К. Е. Абдрахманов
«05» 2023 ж

Резервтегі бактерияға қарсы құралдардың тізімі және оларды қолдануға көрсеткіштер

Препараттың атауы	Қолданылу көрсетілімдері
Цефтазидим/авибактам (Ксавитаз, Завицефта)	Төменгі тыныс алу жолдарының ауыр инфекциялары, асқынған несеп шығару жолдарының инфекциялары, асқынған интраабдоминальды инфекциялар, сепсис/бактериемия, фебрильді нейтропения, сезімтал <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Enterobacter</i> spp., <i>Escherichia coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i> және басқа грамтеріс бактериялар анықталған жағдайда инфекциялық орталық пациенттеріндегі ауыр инфекциялар.
Колистин (Колисод, Кометад)	Төменгі тыныс алу жолдарының ауыр инфекциялары, несеп шығару жолдарының инфекциялары, сепсис/бактериемия, орталық жүйке жүйесінің инфекциялары (көрсетілім бойынша интратекальды/интравентрикулярлы енгізу), ЖРИТ және инфекциялық стационар науқастарындағы сезімтал мультирезистентті <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter</i> spp., <i>Citrobacter</i> spp., <i>Escherichia coli</i> және басқа грамтеріс бактериялар анықталған жағдайда, тиімді балама болмаған кезде.
Линезолид (Линозид, Амизолид)	Төменгі тыныс алу жолдарының ауыр инфекциялары, тері мен жұмсақ тіндердің асқынған инфекциялары, сезімтал грам+ бактериялармен (MRSA, VRE, <i>Streptococcus</i> spp.) шақырылған сепсис/бактериемия, ванкомицинді қолдану мүмкін болмаған немесе оған төзімділік анықталған жағдайда.
Пиперациллин/тазобактам (Ревотаз, Tazorip)	Төменгі тыныс алу жолдарының инфекциялары, асқынған несеп шығару жолдарының инфекциялары, интраабдоминальды инфекциялар, тері мен жұмсақ тіндердің инфекциялары, сүйек пен буын инфекциялары, гинекологиялық инфекциялар, сепсис/бактериемия, фебрильді нейтропения. сезімтал Гр+, Гр- және анаэробты микроорганизмдер (соның ішінде <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)
Тигециклин (Тайген)	Тері мен жұмсақ тіндердің асқынған инфекциялары, асқынған интраабдоминальды инфекциялар, ауруханадан тыс пневмония, сезімтал мультирезистентті MRSA, <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Enterobacterales</i> (соның ішінде БЛРС түзуші штамдар) және анаэробтар шақырған ауыр инфекциялар. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Proteus</i> spp., <i>Morganella morganii</i> және <i>Providencia</i> spp. туындатқан инфекцияларда қолданылмайды.

Резервтік антибиотиктерді қоздырғыштың микробиологиялық зерттеу нәтижелері мен антибиотиктерге сезімталдығын анықтау негізінде, клиникалық фармакологтың (бар болған жағдайда) келісімімен және/немесе консилиум шешімі бойынша тағайындау ұсынылады.