

## 中級計量経済学 2024 練習問題 (1)

以下の問いに答えなさい。(提出の必要はありません。)

1.  $X, Y$  を確率変数とし、 $(Y_i, X_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  をデータとして、以下の問いに答えなさい。

(i) 確率変数  $X, Y$  の密度関数を  $f(x, y)$  とする。 $X$  の周辺密度関数  $f_X(x)$  と  $Y$  の周辺密度関数  $f_Y(y)$  を  $f(x, y)$  で表しなさい。また、 $X$  を条件とする  $Y$  の条件付き密度関数はどのように定義されるか？

(ii) それを用いて、繰り返し期待値の法則  $E(Y) = E\{E(Y|X)\}$  が成り立つことを示しなさい。

(iii) 分散について  $E[\{X - E(X)\}^2] = E[X\{X - E(X)\}]$  が成り立つことを示しなさい。

(iv) 共分散について

$$E[\{X - E(X)\}\{Y - E(Y)\}] = E[X\{Y - E(Y)\}] = E[\{X - E(X)\}Y]$$

が成り立つことを示しなさい。

(v) 標本平均  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  について、 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$  が成り立つことを示しなさい。

(vi) 標本分散について  $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i(X_i - \bar{X})$  が成り立つことを示しなさい。

(vii) 標本共分散について、

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i(Y_i - \bar{Y}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})Y_i$$

が成り立つことを示しなさい。

2. 説明変数がひとつの回帰モデル  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$  から無作為標本  $(Y_i, X_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  が得られたとする。 $\beta_0, \beta_1$  の最小二乗推定量を  $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ 、 $Y_i$  の予測値を  $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$  とし、残差を  $\hat{u}_i = Y_i - \hat{Y}_i$  とする。

(i) 最小二乗法の一階の条件を導出し、

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

と表されることを示しなさい。ただし、 $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ ,  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  とする。

(ii) (i) と問 1 の結果を用いて、

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_1 - \beta_1) = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})u_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

と表されることを示しなさい。

(iii)  $E(X_i) = \mu_X$  とする。 $X_i - \bar{X} = (X_i - \mu_X) - (\bar{X} - \mu_X)$  と分解し、中心極限定理と大数の法則、スラツキーの補題を用いて、 $\sqrt{n}(\hat{\beta}_1 - \beta_1)$  の漸近正規性を示しなさい。

(iv) (i) で得た一階の条件から  $\sum_{i=1}^n \hat{u}_i = 0$ 、 $\sum_{i=1}^n X_i \hat{u}_i = 0$  となることを示しなさい。

(v)  $Y_i - \bar{Y} = (Y_i - \hat{Y}_i) + (\hat{Y}_i - \bar{Y})$  と分解し、以上の結果を用いて

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2$$

が成り立つことを示し、その結果  $0 \leq R^2 \leq 1$  であることを示しなさい。

3. 真の定数項が 0 の回帰モデル  $Y_i = \beta_1 X_i + \epsilon_i$ ,  $E(\epsilon_i | X_i) = 0$  から無作為標本  $(Y_1, X_1), \dots, (Y_n, X_n)$  が得られたとする。A さんは定数項が 0 であることを知らずに定数項を含めずに

$$\min_{b_0, b_1} \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2$$

という最小二乗推定を行い、 $\hat{\beta}_1^A$  を得たとする。他方、B さんは定数項が 0 であることを知っており

$$\min_{b_1} \sum_{i=1}^n (Y_i - b_1 X_i)^2$$

から  $\hat{\beta}_1^B$  を得たとする。

(i)  $\hat{\beta}_1^A$  と  $\hat{\beta}_1^B$  が共に一致性をもつことを示しなさい。

(ii)  $\hat{\beta}_1^A$  と  $\hat{\beta}_1^B$  の漸近分布を求めなさい。

(iii) (ii) で求めた漸近分散の結果から、 $\hat{\beta}_1^A$  と  $\hat{\beta}_1^B$  のどちらの推定量が望ましいか？

4. 本当の関係が  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \epsilon_i$ ,  $E(\epsilon_i | X_i, Z_i) = 0$  である時に、無作為標本  $(Y_i, X_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  が得られたとする。 $Z_i$  のデータが得られなかったため、回帰モデル  $Y_i = b_0 + b_1 X_i + u_i$  を用いて、最小二乗推定を行うことを考える。 $E(X) = \mu_X$ ,  $E(Z) = \mu_Z$ ,  $Var(X) = \sigma_X^2$ ,  $Var(Z) = \sigma_Z^2$ ,  $Cov(X, Z) = \sigma_{XZ}$  とする。最小二乗推定量  $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$  のそれぞれについて、 $n \rightarrow \infty$  としたときのバイアス（確率収束の収束先と真の値の差）を求めなさい。その結果、どのような場合にバイアスが大きくなるか述べなさい。

5. 説明変数が、0 または 1 の値を取るダミー変数  $D_i$  である回帰モデル

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + u_i$$

から無作為標本  $(Y_i, D_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  が得られたとする。また、データは  $i = 1, 2, \dots, n_1$  について  $D_i = 1$ ,  $i = n_1 + 1, \dots, n$  について  $D_i = 0$  となるように並べられているとする。そのとき、 $\beta_1$  の OLS 推定量  $\hat{\beta}_1$  は、 $D_i = 1$  の  $Y$  の平均と  $D_i = 0$  の  $Y$  の平均の差となることを示しなさい。つまり

$$\hat{\beta}_1 = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0$$

ただし  $\bar{Y}_1 = \sum_{i=1}^{n_1} Y_i / n_1$ ,  $\bar{Y}_0 = \sum_{i=n_1+1}^n Y_i / (n - n_1)$  である。