FICHA TÉCNICA

AGKEM

OVER 18

RSCO-HEDE-0231-X0149-375-18.4
HERBICIDA / CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% En Peso
Glufosinato de amonio: Ácido de amonio (2RS)-2-amino-4-(metilfosfinato)butírico (Equivalente a 200 g de ingrediente activo / L a 20ºC)	18.4 %
INGREDIENTES INERTES: Humectante, agente neutralizante y solvente.	81.6 %
TOTAL:	**100 %**

OVER 18 es un herbicida para el control de las plagas que se indican en los cultivos descritos en la presente ficha técnica.

RECOMENDACIONES DE USO

Utilice **OVER 18** de acuerdo a las siguientes instrucciones

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca girando en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad, abra el frasco y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con poca agua y la dosis a emplear de **OVER 18**. Una vez que el líquido se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar. Use el equipo de protección como lo indica la sección de "Precauciones y Advertencias de Uso" de esta etiqueta.

CONTRAINDICACIONES. No aplicar en horas de calor intenso ni con vientos mayores de 15 km/h, o cuando se pronostique lluvia próxima.

FITOXICIDAD. OVER 18 no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. OVER 18 este producto es compatible con otros plaguicidas como Oxifluorfen 240 g/L EC y Pendimetalina 500 g/L EC.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar.

Si ha ocurrido contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos.

Si existe contacto del producto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

En caso de ingestión si la persona está consciente y alerta puede inducir el vómito, si esta inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediata atención médica.

NOCIVO SI SE INHALA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

Grupo químico: Ácidos fosfínicos.

No existe antídoto especifico, por lo que, en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Maíz (SL) Sorgo (SL)	Coquillo *(Cyperus rotundus)* Lechosa *(Euphorbia heterophylla)* Flor amarilla *(Baltimora recta)* Tomatillo *(Physalis angulata)* Zacate de agua *(Echinochloa colonum)*	1.125 – 1.5	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia dirigida a la maleza, cuando ésta se encuentre en crecimiento activo no mayor a 15 cm de altura, volumen de aplicación 150-250 L/ha.
Aguacate (SL)	Correhuela (*Convolvus arvensis*) Legua de vaca (*Rumex crispus*) Zacate cadillo (*Cenchrus echinatus*) Rosa amarilla (*Melampodium microcephalum*) Vinagrillo (*Oxalis corniculata*) Zacate kikuyo (*Pennisetum clandestinum*)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza, en postemergencia temprana a la maleza, cuando esta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 300 – 400 L de agua/ha.
Agave (SL)	Fresadilla (*Aldama dentata*) Gusanillo (*Acalypha setosa*) Rosa amarilla (*Melampodium divaricatum*) Zacate pega pega (*Setaria adhaerens*) Pasto rosado (*Melinis repens*) Zacate horquetilla (*Brachiaria plantaginea*)	1.25 – 1.75	
Caña de azúcar (SL)	Rosa amarilla (*Bidens ferulifolia*) Verdolaga (*Portulaca oleraceae*) Toloache (*Datura stramonium*) Zacate conejo (*Digitaria ciliaris*) Zacate de agua (*Echinochloa colona*) Lechuguilla (*Euphorbia cuphosperma*) Espiguilla (*Verbena litoralis*)	1.0 – 2.5	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza, en postemergencia temprana a la maleza, cuando esta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 200 – 300 L de agua/ha.
Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Vid, Kiwi (SL)	Coyolillo (*Cyperus odoratus*) Lentejilla (*Lepidium virginicum*) Cebadilla (*Bromus carinatus*) Rosila blanca (*Erigeron longipes*) Campanilla herida (*Convolvus equitans*) Pasto elástico (*Eragrostis tenuiifolia*)		
Algodón (SL)	Golondrina (*Euphorbia indivisa*) Grama (*Chloris radiata*) Pasto guindillo (*Paspalum denticulatum*) Coquillo (*Cyperus rotuntus*) Junquillo (*Aster spinosus*) Mostaza (*Brassica nigra*)	1.25 – 3.0	
Jitomate, Berenjena, Chile, Tomate verde, Papa, Pimiento morrón (SL)	Ojo de gallo (*Sanvitalia procumbens*) Lechosa (*Euphorbia hirta*) Amargosa (*Parthenium hysterophorus*) Coquillo (*Cyperus esculentus*) Pega pega (*Desmodium neomexicanum*) Quesitos (*Anoda cristata*) Triguillo (*Sotaria parviflora*)	1.25 – 2.5	
Plátano (SL)	Sanguinaria (*Polygonum aviculare*) Zacate guinea (*Urochloa maxima*) Tripa de pollo (*Commelina diffusa*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Zacate casamiento (*Eragrostis mexicana*) Acahual (*Tithonia tubiformis*) Singonio (*Syngonium podophyllum*) Mirasol (Cosmos bipinnatus)		
Naranjo, Toronja, Limón, Lima, Mandarina, Pomelo, Cidro, Tangerino (SL)	Quelite (*Amaranthus hybridus*) Correhuela (*Convolvus arvensis*) Arrocillo (*Echinochloa colona*) Zacate antenita (*Paspalum distichum*) Zacate Johnson (*Sorghum halepense*) Aceitilla (*Bidens pilosa*) Alfalfa comarrona (*Melilotus alba*)	1.5 – 3.0	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza, en postemergencia temprana a la maleza, cuando esta tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido 250 – 500 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas
SL: Sin Límite
( ): Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.