

PARCIAL 1 - ESTADÍSTICA II

ITAM, Primavera 2020

26/02/2020

Instrucciones

El examen consta de dos secciones. La primera es opción múltiple y V/F donde se deberá seleccionar la opción correcta. Para cada pregunta hay una sola respuesta correcta. Si se selecciona más de una opción será considerada como incorrecta. En la segunda sección se deberá desarrollar el problema planteado. Se debe cuidar la formalidad al escribir los resultados, ya que es parte de la calificación del problema. En caso de no tener el desarrollo de la pregunta, o bien se llegó a la respuesta sin una justificación se podrá anular la respuesta.

El examen tiene una duración de 1:45 horas. **Cualquier práctica fraudulenta es sancionada de acuerdo al reglamento de la coordinación y el departamento de estadística.**

Seccion A: Opción múltiple y V/F(30 pts)

1. (8 pts) MUESTREO: Un fabricante de Estados Unidos produce autos que garantizan que la pintura dura al menos 5 años sin corrosión. Como parte del proceso de calidad se decide tomar una muestra aleatoria de 100 autos con más de 5 años para ver el estado de la pintura (sin corrosión / con corrosión).

Los automóviles producidos por la fábrica desde el día 1 es:

- ☐ Marcos muestrales
- ☐ Unidades de muestreo
- ☐ Población
- ☐ Muestra
- ☐ Ninguna de las anteriores

Los automóviles con más de 5 años producidos por la fábrica es:

- ☐ Marcos muestrales
- ☐ Variable de interes
- ☐ Población
- ☐ Muestra
- ☐ Ninguna de las anteriores

Cada uno de los automóviles con más de 5 años es:

- ☐ Muestra
- ☐ Unidades de muestreo
- ☐ Población

- ☐ Variable de interés
- ☐ Ninguna de las anteriores

El conjunto de los 100 autos es:

- ☐ Muestra
- ☐ Unidades de muestreo
- ☐ Población
- ☐ Variable de interés
- ☐ Ninguna de las anteriores

2. (2 pts) MUESTREO: Son colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa.

- ☐ Marcos muestrales
- ☐ Unidades de muestreo
- ☐ Elemento muestral
- ☐ Muestra

3. (2 pts) MUESTREO: Es una lista de unidades de muestreo.

- ☐ Marcos muestrales
- ☐ Unidades de muestreo
- ☐ Elemento muestral
- ☐ Muestra

4. (2 pts) MUESTREO: Consiste en seleccionar una muestra mediante la separación de los elementos de la población en grupos que no presenten traslapes, de manera que cada grupo sea homogéneo entre sus elementos, pero heterogéneo entre grupos.

- ☐ Muestreo aleatorio simple
- ☐ Muestreo aleatorio estratificado
- ☐ Muestreo por conglomerados
- ☐ Muestreo por cuotas

5. (2 pts) DISTRIBUCIONES MUESTRALES: Sean Y_1, Y_2, \dots, Y_n variables iid distribuidas normalmente con $E(Y_i) = \mu_i$ y $V(Y_i) = \sigma_i^2$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Definiendo $Z_i = \frac{Y_i - \mu_i}{\sigma_i}$, entonces $\sum_{i=1}^n Z_i^2$ sigue una distribución:

- ☐ t-student con $n - 1$ g.l.
- ☐ Normal con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$
- ☐ F con $n - 1$ y $m - 1$ g.l.
- ☐ χ^2 con $n - 1$ g.l.

6. (2 pts) DISTRIBUCIONES MUESTRALES: Sean W_1 y W_2 v.a. independientes con distribución χ^2 con v_1 y v_2 g.l. respectivamente. Entonces se dice que: $\frac{W_1/v_1}{W_2/v_2}$ sigue una distribución:

- ☐ t-student con v_1 g.l.
- ☐ Normal con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$
- ☐ F con v_1 y v_2 g.l.
- ☐ χ^2 con v_1 g.l.

7. (2 pts) DISTRIBUCIONES MUESTRALES: Es una función de las variables aleatorias observables en una muestra y de constantes conocidas.

- ☐ Estadístico
- ☐ Parámetro
- ☐ Distribución
- ☐ Media poblacional

8. (10 pts) Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. El objetivo de la inferencia estadística es analizar a toda la población para obtener conclusiones
2. Si se toman dos muestras aleatorias del mismo tamaño de la misma población, el valor del estadístico que se calcule será el mismo para ambas
3. En una distribución de muestreo exacta, buscamos tener una sola muestra y hacer inferencia estadística con ella.
4. La dispersión de la media muestral para un tamaño de muestra $n > 1$, siempre es menor que la varianza de la población completa (con reemplazo)
5. Se tiene el experimento de lanzar una moneda y donde los posibles valores son águila, sol. Se toma una muestra de tamaño 1, si se calcula la distribución de muestreo exacta para \bar{X} es la misma que la de la distribución original

Sección B: Preguntas a desarrollar (70 pts)

1. (25 pts) Para las siguientes preguntas resuelve

1. (8 pts) El peso de unas cajas se distribuye de forma normal con media 10 kgs y desviación estándar de 3. Si se toma una muestra de 9 productos, ¿Cuál es la probabilidad que la varianza muestral esté entre 1 y 3?
2. (8 pts) Se sabe que la demanda de transporte en una plataforma digital en una región se distribuye Poisson con media de 600 por día. En otra plataforma se distribuye Poisson con media de 590 por día. Si se toma una muestra de 30 en cada aplicación, calcule la probabilidad de que diferencia de medias muestrales entre ambas plataformas sea mayor a 20
3. (9 pts) En una caja, las variaciones en el número personas atendidas por los cajeros A y B es la misma. Se obtuvo el número promedio de personas por día por cada cajero, así como la varianza muestral. Esto se realizó durante 16 y 21 días respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad que el cociente de varianzas muestrales exceda 0.54 suponiendo que, los números de unidades manejadas por día por los cajeros son v.a. independientes que se distribuyen normal?

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| Y_1 | 2 | 5 | 8 |
| $P(Y_1)$ | 2/3 | 1/6 | 1/6 |

| | | |
|----------|-----|-----|
| Y_2 | 1 | 5 |
| $P(Y_2)$ | 1/2 | 1/2 |

2. (15 pts) Si \bar{Y}_1 y \bar{Y}_2 son medias muestrales de dos poblaciones con las distribuciones mostradas arriba:
Obtenga la probabilidad de que $\bar{X}_1 + \bar{X}_2$ sea mayor que 8 cuando se toman muestras aleatorias independientes con reemplazo de tamaño $n_1 = 15$, $n_2 = 15$ (Asuma TCL)
3. (15 pts) En una fabrica de galletas tienen 5 lineas de producción L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 . Se sabe que que las lineas L_3, L_4, L_5 requieren reparación.
 1. (5 pts) Obtenga el espacio muestral si se toman muestras de dos lineas sin reemplazo
 2. (5 pts) Obtenga la distribución de muestreo de la proporción de lineas \hat{p} que necesitan reparación,
 3. (5 pts) Calcule el valor esperado de la distribución de muestreo y la varianza de la distribución de muestreo $E(\hat{p})$ y $V(\hat{p})$
4. (15 pts) Suponga que una variable aleatoria X puede tomar los valores $\{10, 50, 70\}$ con probabilidades $\{0.1, 0.3, 0.6\}$. Considere muestras de tamaño 2 con reemplazo.
 1. (3 pts) Calcule $E(X)$ y $V(X)$
 2. (4 pts) Obtenga el espacio muestral
 3. (4 pts) Obtenga distribución de muestreo de \bar{X} , $E(\bar{X})$ y $V(\bar{X})$
 4. (2 pts) Calcule la probabilidad que \bar{X} tome valores entre 10 y 30 (inclusivo)
 5. (2 pts) ¿La distribución de \bar{X} es exacta? Justifique