Problem J1: Concert Tickets



Problem Description

Besa wants to buy tickets for the upcoming Saylor Twift concert.

Given the total number of tickets for the concert and the number of tickets other people have purchased, your job is to determine whether or not Besa can buy her desired number of tickets.

Input Specification

The first line of input contains a positive integer, B, representing the number of tickets Besa wants to buy. The second line contains a positive integer, T, representing the total number of tickets for the concert. The third line contains a positive integer, P, where $P \leq T$, representing the number of tickets other people have purchased.

Output Specification

If Besa cannot buy B tickets, output `N`. Otherwise, output `Y`, followed by a single space, followed by the number of tickets that would remain after Besa buys B tickets.

Sample Input 1

```
5
100
70
```

Output for Sample Input 1

```
Y 25
```

Explanation of Output for Sample Input 1

There are a total of 100 tickets for the concert. Besa wants to buy 5 tickets and other people have purchased 70 tickets. So, $100 - 75 = 25$ tickets would remain after Besa buys 5 tickets.

Sample Input 2

```
3
200000
199998
```

Output for Sample Input 2

```
N
```

Explanation of Output for Sample Input 2

There are a total of 200 000 tickets for the concert. Besa wants to buy 3 tickets and other people have purchased 199 998 tickets. So, Besa cannot buy 3 tickets.

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Problème J1 : Billets de concert



Énoncé du problème

Besa veut acheter des billets pour le prochain concert de Saylor Twift.

Votre tâche consiste à déterminer si Besa peut ou non acheter le nombre de billets qu'elle souhaite, étant donné le nombre total de billets pour le concert et le nombre de billets déjà achetés par d'autres personnes.

Précisions par rapport aux données d'entrée

La première ligne des données d'entrée contient un entier strictement positif B représentant le nombre de billets que Besa souhaite acheter. La deuxième ligne contient un entier strictement positif T représentant le nombre total de billets pour le concert. La troisième ligne contient un entier strictement positif P, avec $P \leq T$, représentant le nombre de billets déjà achetés par d'autres personnes.

Précisions par rapport aux données de sortie

Les données de sortie devraient afficher `N` si Besa ne peut pas acheter les B billets. Dans le cas contraire, les données de sortie devraient afficher `Y`, suivi d'un seul espace, puis du nombre de billets restants après l'achat de B billets.

Données d'entrée d'un 1er exemple

```
5
100
70
```

Données de sortie du 1er exemple

```
Y 25
```

Justification des données de sortie du 1er exemple

Il y a un total de 100 billets pour le concert. Besa veut acheter 5 billets, et d'autres personnes ont déjà acheté 70 billets. Donc, $100 - 75 = 25$ billets resteront disponibles après l'achat de 5 billets par Besa.

Données d'entrée d'un 2e exemple

```
3
200000
199998
```

Données de sortie du 2e exemple

```
N
```

The English version appears before the French version.

Justification des données de sortie du 2e exemple

Il y a un total de 200 000 billets pour le concert. Besa veut acheter 3 billets, et d'autres personnes ont déjà acheté 199 998 billets. Donc, Besa ne peut pas acheter 3 billets.

The English version appears before the French version.