

Исследование операций Векторные операции

Доцент каф. АСУ: Суханов А.Я.

Теория

Векторная операция представляет собой вектор частных критериев эффективности, каждый из которых зависит от действующих факторов операции. Здесь X представляют собой контролируемые факторы.

$$W(X) = (W_1(X), W_2(X), \dots, W_n(X))$$

$$X \in \Omega_X$$

Стратегия из области
допустимых решений

$$\Omega_X^c \in \Omega_X$$

Область согласия

$$\Omega_X^K \in \Omega_X$$

Область компромиссов

Проблемы
векторной
оптимизации

Определение
области
компромисса

Выбор схемы
компромисса

Нормализация
критериев

Учет
приоритета
критериев

Сравнимость по Парето на примере задачи минимизации критериев векторной операции

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))^T$$

i

Номер частного критерия

$$\min \{f(x) : x \in X\}$$

В качестве задачи оптимизации рассматривается
минимизация векторной операции

$$f_i(x) < f_i(y), \quad i \in L(x, y),$$

Множество частных критериев для которых
стратегия x лучше стратегии y

$$f_i(x) > f_i(y), \quad i \in G(x, y),$$

Множество частных критериев для которых
стратегия x хуже стратегии y

$$f_i(x) = f_i(y), \quad i \in E(x, y),$$

Множество частных критериев для которых
стратегия x равнозначна стратегии y

$$G(x, y) = \emptyset$$

X не хуже по Парето чем Y

$$G(x, y) = \emptyset \text{ и } L(x, y) \neq \emptyset$$

X лучше по Парето чем Y

$$G(x, y) \neq \emptyset \text{ и } L(x, y) \neq \emptyset$$

X и Y несравнимы по Парето



Очевидно что

$$\begin{cases} \Phi(x) \rightarrow \max \\ \Psi(x) \rightarrow \min \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Phi(x) \rightarrow \max \\ -\Psi(x) \rightarrow \max \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\Phi(x) \rightarrow \min \\ \Psi(x) \rightarrow \min \end{cases}$$



Оптимальность по Парето

$x \in X$

Оптимально по Парето если во множестве X нет другого решения, которое лучше по Парето

Определить оптимальные по Парето решения

$$\min \left\{ \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 + x_2 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right\}$$

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$


Оптимальность по Парето и область компромиссов на примере задачи максимизации

$$\Omega_W^C \cap \Omega_W^K = \emptyset$$


$$\Omega_X^C = \Omega_X \setminus \Omega_X^K$$

$$\Omega_W^C \cup \Omega_W^K = \Omega_W$$


Оба решения
можно
улучшить








Одно решение
можно улучшить
при неизменности
другого



Одно решение
улучшается при
ухудшении другого




Примеры области компромиссов



Виды компромиссов

Метод уступок — Один или несколько критериев снижаются, в зависимости от совокупности других критериев или лицо, принимающее решения (руководитель), подводится к выбору решения путем постепенного ослабления первоначальных требований, как правило, одновременно невыполнимых.

Метод идеальной точки — в области допустимых значений неизвестных ищется такая их совокупность, которая способна обеспечить набор значений критериев, в том или ином смысле ближайших к наилучшему, как правило, недостижимому (в так называемой точке утопии).




Виды компромиссов


Метод свертывания — лицо, принимающее решения (руководитель), сводит многокритериальную задачу к задаче с одним критерием.

Метод ограничений — множество допустимых значений неизвестных уменьшается путем осмысленного введения дополнительных ограничений на заданные критерии.

Метод анализа иерархий — на основании суждений экспертов оценивается вклад в общую оценку каждого критерия (приоритетный способ).




Метод равномерной уступки и его недостатки




Принцип максимина

Выбирается наихудший из имеющихся критериев и по нему проводится максимизация

$$\mathit{opt} \overline{W} = \max_{W \in \Omega_W^K} \min_{l \leq i \leq k} W_i$$



Принцип справедливой абсолютной уступки



$$\begin{aligned}\Delta_{abc} &= (W_1^1 - W_1^0) + (W_2^1 - W_2^0) = \\ &= (4 - 7) + (4 - 2) = -1\end{aligned}$$

$\Phi(7,2)$ лучше

справедливым считается такой компромисс, при котором суммарный абсолютный уровень снижения одного или нескольких критериев не превосходит суммарного абсолютного уровня повышения других критериев

Можно свести к:

$$\begin{aligned}\text{opt } \vec{W} &= \max_{\vec{W} \in \Omega_W^K} \sum_{i=1}^n W_i \\ \Delta &= W_1^1 + W_2^1 - (W_1^0 + W_2^0)\end{aligned}$$


Принцип относительной справедливой

- Справедливым является такой компромисс, при котором суммарный относительный уровень снижения одного или нескольких локальных критериев не превосходит суммарного относительного уровня повышения эффективности по остальным критериям
- **Важным** преимуществом принципа является то, что он инвариантен к масштабу измерения критериев

$$\Delta_{\text{омх}} = \sum_{i=1}^n \frac{W_i^1 - W_i^0}{W_i^0}$$

Можно свести к:

$$\text{opt } \vec{W} = \max_{\vec{W} \in \Omega} \prod_{i=1}^n W_i$$



$$\Delta_{\text{омн}} = \frac{4-7}{7} + \frac{4-2}{2} = -\frac{3}{7} + 1 = \frac{4}{7}$$

$\Phi(7,2)$ хуже


$$d = \frac{\sum_{j=1}^n \prod_{i \in (1..n)} W_i^{1 \dots W_i^{0..1} \cdot W_i^0} - n \prod_i W_i^0}{\prod_i W_i^0}$$

Метод (последовательных) уступок


- Как видно из рисунка задача максимизации двух критериев решения не имеет, так как точка утопии находится вне области допустимых решений
- Метод состоит в том, что лицо, принимающее решения (ЛПР), работая в режиме диалога с аналитиком-специалистом, последовательно сужает множество точек на границе Парето и в конце концов соглашается остановиться на некоторой компромиссной паре значений критериев

$$U = \Phi(x,y), V = \Psi(x,y), (x,y) \in \omega.$$

$$AB \supset A_1B \supset A_1B_2 \supset A_3B_2 \supset A_3B_4 \supset A_5B_4 \supset \dots$$




$$\begin{aligned} \Phi(x,y) &\rightarrow \max \\ \Psi(x,y) &\rightarrow \max, \\ &(x,y) \in \omega \end{aligned}$$



Метод идеальной точки


- состоит в отыскании на границе Парето точки, ближайшей к точке утопии, задаваемой лицом, принимающим решения.
- Пусть на множестве ω плоскости (x, y) , определяемом системой неравенств заданы функции U и V , требуется решить задачу максимизации

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$




$$\alpha U + \beta V = \gamma$$

$$\begin{aligned} U &= 5x - y + 2 \\ V &= -x + 3y + 2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 8\beta &= \gamma \\ 10\alpha + 6\beta &= \gamma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U(x,y) &\rightarrow \max \\ V(x,y) &\rightarrow \max, \end{aligned}$$



α, β и $\gamma \rightarrow$

?

Продолжение решения

$$\beta = \frac{\gamma}{8}$$

$$\alpha = \frac{\gamma}{40}$$

Положим $\gamma = 40$. Тогда $\alpha = 1, \beta = 5$ и
 $U + 5V = 40$

Искомое уравнение прямой




Рис. 13

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Томск, ул. Вершинина, 47, офис 434

e-mail: aleksandr.i.sukhanov@tusur.ru

тел.: (3822) 70-15-36