age ~ bmi+injured

25.699 + (−0.039)*bmi + (1.475)*injured

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC

F−statistic: 7.05864 on 2 and 617 Degrees of Freedom


F p−value: 0.00093


R−Squared: 0.02237


Adjusted R−Squared: 0.019199718287501


Root MSE: 3.82105756512129


AIC: 3429.73755109934



age against bmi
age
bmi
20
25
30
35
20
22
24
26
28



age against injured
age
injured
35
30
25
20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Residuals vs Fitted
363
185
424
10
5
0
−5
−10
Residuals
25.0
25.5
26.0
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
185
363
424
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
363
185
424
1.5
1.0
0.5
0.0
√|Standardized residuals|
25.0
25.5
26.0
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
169
363
546
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
Leverage
lm(formula)
363
546
169
Cook's distance
3
2
1
0
−1
−2
−3
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3
2.5
169
363
546
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
0.5
1
1.5
2
0
0.005
0.01
0.015
0.02
Leverage h_{ii}
lm(formula)