age ~ bmi

26.246 + (−0.05)*bmi

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05, High R and Adj R,
Low AIC

F−statistic: 0.23726 on 1 and 618 Degrees of Freedom


F p−value: 0.62636


R−Squared: 0.00038


Adjusted R−Squared: −0.00123372738786642


Root MSE: 3.86378258273609


AIC: 3441.5256238994



age against bmi
age
bmi
20
25
30
35
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
363
156
185
Residuals
10
5
0
−5
−10
24.9
25.0
25.1
25.2
25.3
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
363
185
156
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
363
156
185
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
24.9
25.0
25.1
25.2
25.3
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
14
185
363
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
−2
185
363
14
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
Cook's distance
Leverage h_{ii}
lm(formula)
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
0.005
0.01
0.015
2
1.5
1
0.5
0
3
2.5
363
185
14