age ~ injured

24.79 + (1.479)*injured

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05, High R and Adj R, Low AIC

F−statistic: 13.99383 on 1 and 618 Degrees of Freedom


F p−value: 2e−04


R−Squared: 0.02214


Adjusted R−Squared: 0.0205600644380246


Root MSE: 3.82149986880476


AIC: 3427.88107807257



age against injured
age
injured
35
30
25
20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Residuals vs Fitted
Residuals
10
5
0
−5
−10
424
25.0
25.5
26.0
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
185
363
424
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
424
25.0
25.5
26.0
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
169
156
546
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
Cook's distance
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
−2
−3
156
Cook's distance
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
Cook's distance
Leverage h_{ii}
lm(formula)
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
156