age ~ prev_injuries

25.026 + (0.042)*prev_injuries

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC

F−statistic: 0.08736 on 1 and 618 Degrees of Freedom


F p−value: 0.76766


R−Squared: 0.00014


Adjusted R−Squared: −0.00147655270048075


Root MSE: 3.86425108839506


AIC: 3441.67597185143



age against prev_injuries
age
prev_injuries
20
25
30
35
0
1
2
3
4



Residuals vs Fitted
185
381
363
10
5
0
−5
−10
Residuals
25.05
25.10
25.15
25.20
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
363
185
381
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
185
381
363
1.5
1.0
0.5
0.0
√|Standardized residuals|
25.05
25.10
25.15
25.20
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
256
439
114
Cook's distance
0.00
0.01
0.02
0.03
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
−2
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)
Cook's distance
114
439
256


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3
2.5
256
439
114
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0
0.5
1
1.5
2
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
Leverage h_{ii}
lm(formula)