


age ~ training_load+bmi
25.333 + (0.237)*training_load + (−0.044)*bmi


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 1.29143 on 2 and 617 Degrees of Freedom
F p−value: 0.27562
R−Squared: 0.00417
Adjusted R−Squared: 0.000940744709393981
Root MSE: 3.85646072931306
AIC: 3441.17359933238



age against training_load
age
training_load
20
25
30
35
1
2
3
4
5



age against bmi
age
bmi
20
25
30
35
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
363
185
424
Residuals
10
5
0
−5
−10
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
363
185
424
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
363
185
424
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.4
25.6
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
14
185
363
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
Leverage
lm(formula)
Cook's distance
185
363
14
3
2
1
0
−1
−2
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3
2.5
2
363
185
14
Cook's distance
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
Leverage h_{ii}
lm(formula)