bmi ~ age+injured

23.692 + (−0.006)*age + (−0.11)*injured

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05, High R and Adj R,
Low AIC

F−statistic: 0.36052 on 2 and 617 Degrees of Freedom


F p−value: 0.69746


R−Squared: 0.00117


Adjusted R−Squared: −0.00207045292371522


Root MSE: 1.50618281114973


AIC: 2275.36113426366



bmi against age
bmi
age
20
22
24
26
28
20
25
30
35



bmi against injured
bmi
injured
20
22
24
26
28
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
lm(formula)
23.40
23.45
23.50
23.55
4
2
0
−2
−4
184
3
474


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
184
474
3
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
3
474
184
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
23.40
23.45
23.50
23.55
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
59
363
447
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
Cook's distance
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
−2
−3
447
363
59
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3.5
3
2.5
2
363
59
447
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0
0.005
0.01
0.015
1.5
1
0.5
0
Leverage h_{ii}
lm(formula)