bmi ~ age+prev_injuries

23.706 + (−0.008)*age + (0.008)*prev_injuries

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC

F−statistic: 0.12753 on 2 and 617 Degrees of Freedom


F p−value: 0.88029


R−Squared: 0.00041


Adjusted R−Squared: −0.00282693806552392


Root MSE: 1.50675122924588


AIC: 2275.82900939013



bmi against age
bmi
age
20
22
24
26
28
20
25
30
35



bmi against prev_injuries
bmi
prev_injuries
20
22
24
26
28
0
1
2
3
4



Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
lm(formula)
184
3474
4
2
0
−2
−4
23.45
23.50
23.55
23.60


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
184
474
3
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
3474
184
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
23.45
23.50
23.55
23.60
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
271
363
220
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
Leverage
lm(formula)
Cook's distance
220
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
−3
−2
−1
0
1
2
3


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3
2.5
2
271
363
220
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0
0.5
1
1.5
0
0.005
0.01
0.015
0.02
Leverage h_{ii}
lm(formula)