


bmi ~ age
23.712 + (−0.008)*age


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 0.23726 on 1 and 618 Degrees of Freedom
F p−value: 0.62636
R−Squared: 0.00038
Adjusted R−Squared: −0.00123372738786642
Root MSE: 1.50677341687344
AIC: 2273.84726884469



bmi against age
bmi
age
20
22
24
26
28
20
25
30
35



Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
lm(formula)
23.45
23.50
23.55
4
2
0
−2
−4
184
3
474


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
184
474
3
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
3
474
184
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
23.45
23.50
23.55
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
363
185
517
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
−2
−3
517
363
185
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3.5
3
2.5
363
517
185
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0
0.5
1
1.5
2
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
Leverage h_{ii}
lm(formula)