bmi ~ injured

23.543 + (−0.119)*injured

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05, High R and Adj R, Low AIC

F−statistic: 0.57899 on 1 and 618 Degrees of Freedom


F p−value: 0.447


R−Squared: 0.00094


Adjusted R−Squared: −0.000680605562733527


Root MSE: 1.50635715822354


AIC: 2273.50466123689



bmi against injured
bmi
injured
20
22
24
26
28
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
lm(formula)
184
473
4
2
0
−2
−4
23.42
23.44
23.46
23.48
23.50
23.52
23.54


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
3
474
184
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
23.42
23.44
23.46
23.48
23.50
23.52
23.54
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
59
27
485
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
−2
−3
27
485
59
Cook's distance
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3.5
3
59
27
485
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Leverage h_{ii}
lm(formula)