


injured ~ age+bmi
−0.02 + (0.015)*age + (−0.007)*bmi


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 7.23306 on 2 and 617 Degrees of Freedom
F p−value: 0.00079
R−Squared: 0.02291
Adjusted R−Squared: 0.0197415518545012
Root MSE: 0.384211601207052
AIC: 581.34710781506



injured against age
injured
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20
25
30
35
age



injured against bmi
injured
bmi
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
lm(formula)
1.0
0.5
0.0
−0.5
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1546
447


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
169
546
447
−1
0
1
2
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
169
447
546
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
546
447
169
Standardized residuals
2
1
0
−1
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
2.5
2
169
546
447
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Cook's distance
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
0.02
Leverage h_{ii}
lm(formula)