


injured ~ age+prev_injuries
−0.259 + (0.015)*age + (0.085)*prev_injuries


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 26.06327 on 2 and 617 Degrees of Freedom
F p−value: 0
R−Squared: 0.0779
Adjusted R−Squared: 0.0749133816706692
Root MSE: 0.373242746608072
AIC: 545.431199159749



injured against age
injured
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20
25
30
35
age



injured against prev_injuries
injured
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
prev_injuries



Residuals vs Fitted
169
305
1.0
0.5
0.0
−0.5
Residuals
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
169
72505
3
2
1
0
−1
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
169
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
169
381
546
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
169
546
381
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3
2.5
2
169
546
381
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Cook's distance
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
0.02
Leverage h_{ii}
lm(formula)