


injured ~ bmi
0.371 + (−0.008)*bmi


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 0.57899 on 1 and 618 Degrees of Freedom
F p−value: 0.447
R−Squared: 0.00094
Adjusted R−Squared: −0.000680605562733749
Root MSE: 0.388507649395183
AIC: 593.13518061512



injured against bmi
injured
bmi
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
Residuals
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−3
−2
−1
0
1
2
3
271
27


Scale−Location
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
27
59
485
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
27
485
59
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
2.5
2
59
27
485
1.5
1
0.5
0
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
0.005
0.01
0.015
Leverage h_{ii}
lm(formula)