


injured ~ minutes_played+training_load+bmi
0.152 + (0)*minutes_played + (0.051)*training_load + (−0.006)*bmi


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 4.01967 on 3 and 616 Degrees of Freedom
F p−value: 0.00755
R−Squared: 0.0192
Adjusted R−Squared: 0.0144238047643271
Root MSE: 0.384940010652023
AIC: 585.695742252959



injured against minutes_played
injured
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1000
2000
3000
4000
minutes_played



injured against training_load
injured
training_load
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
2
3
4
5



injured against bmi
injured
bmi
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
Residuals
1.0
0.5
0.0
238
281
101
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
238
281
191
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
−3
−2
−1
0
1
2
3


Scale−Location
238
281
101
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
101
238
546
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
238
546
101
Standardized residuals
2
1
0
−1
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
2.5
2
101
238
546
1.5
1
0.5
0
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
Leverage h_{ii}
lm(formula)