


minutes_played ~ age+bmi+injured
2887.68 + (−4.366)*age + (−10.782)*bmi + (84.197)*injured


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 0.60438 on 3 and 616 Degrees of Freedom
F p−value: 0.61234
R−Squared: 0.00293
Adjusted R−Squared: −0.00192107984761281
Root MSE: 708.42360532922
AIC: 9907.65614313489



minutes_played against age
minutes_played
0
1000
2000
3000
4000
20
25
30
35
age



minutes_played against bmi
minutes_played
0
1000
2000
3000
4000
20
22
24
26
28
bmi



minutes_played against injured
minutes_played
0
1000
2000
3000
4000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
injured



Residuals vs Fitted
Residuals
1000
0
−1000
−2000
2450
2500
2550
2600
2650
Fitted values
lm(formula)
43
466
480


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
−3
−2
−1
0
1
2
3
43
480
466


Scale−Location
43
466
480
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
2450
2500
2550
2600
2650
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
Cook's distance
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
43
480
546
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
Leverage
lm(formula)
Cook's distance
480
43
546
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
2
1
0
−1
−2
−3
−4


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3.5
3
546
43
480
Cook's distance
0.00
0.01
0.02
0.03
0
0.005
0.01
0.015
0.02
Leverage h_{ii}
lm(formula)
2.5
2
1.5
1
0.5
0