

minutes_played ~ age


2616.048 + (−3.023)*age


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 0.16767 on 1 and 618 Degrees of Freedom
F p−value: 0.68233
R−Squared: 0.00027
Adjusted R−Squared: −0.00134645076406237
Root MSE: 709.369202847708
AIC: 9905.31018043854



minutes_played against age
minutes_played
0
1000
2000
3000
4000
20
25
30
35
age



Residuals vs Fitted
Residuals
1000
0
−1000
−2000
2510
2520
2530
2540
2550
2560
Fitted values
lm(formula)
53
480
43


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
−3
−2
−1
0
1
2
3
43
480
53


Scale−Location
43
480
53
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
2510
2520
2530
2540
2550
2560
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
43
202
546
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
Leverage
lm(formula)
Cook's distance
43
202
546
0.000
0.005
0.010
0.015
−4
−3
−2
−1
0
1
2


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3.5
3
2.5
2
546
43
202
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
1.5
1
0.5
0
Leverage h_{ii}
lm(formula)