minutes_played ~ bmi

2804.334 + (−11.227)*bmi

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC

F−statistic: 0.35169 on 1 and 618 Degrees of Freedom


F p−value: 0.55338


R−Squared: 0.00057


Adjusted R−Squared: −0.0010484543767646


Root MSE: 709.263642385075


AIC: 9905.1256436511



minutes_played against bmi
minutes_played
0
1000
2000
3000
4000
20
22
24
26
28
bmi



Residuals vs Fitted
Residuals
1000
0
−1000
−2000
2500
2520
2540
2560
2580
Fitted values
lm(formula)
43
480
466


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
−3
−2
−1
0
1
2
3
43
480
496


Scale−Location
43
480
466
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
2500
2520
2540
2560
2580
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
43
59
220
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
Cook's distance
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
Leverage
lm(formula)
Cook's distance
220
59
43
2
1
0
−1
−2
−3
−4
0.000
0.005
0.010
0.015


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3.5
3
43
220
59
Cook's distance
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
Leverage h_{ii}
lm(formula)