


prev_injuries ~ age+bmi
0.727 + (0.003)*age + (0.004)*bmi


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 0.0527 on 2 and 617 Degrees of Freedom
F p−value: 0.94867
R−Squared: 0.00017
Adjusted R−Squared: −0.00307014977331299
Root MSE: 1.08365360335631
AIC: 1867.10327050757



prev_injuries against age
prev_injuries
0
1
2
3
4
20
25
30
35
age



prev_injuries against bmi
prev_injuries
bmi
0
1
2
3
4
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
256
6439
181
Residuals
3
2
1
0
−1
0.88
0.90
0.92
0.94
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
−3
−2
−1
0
1
2
3
−1
0
1
2
3
5344
339
256


Scale−Location
256439
534
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
0.88
0.90
0.92
0.94
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
256
271
129
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
129
271
256
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3
2.5
2
256
271
129
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
0.02
Leverage h_{ii}
lm(formula)