prev_injuries ~ age

0.82 + (0.003)*age

A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC

F−statistic: 0.08736 on 1 and 618 Degrees of Freedom


F p−value: 0.76766


R−Squared: 0.00014


Adjusted R−Squared: −0.00147655270048075


Root MSE: 1.08366956067036


AIC: 1865.12152996213



prev_injuries against age
prev_injuries
0
1
2
3
4
20
25
30
35
age



Residuals vs Fitted
256
439
515
Residuals
3
2
1
0
−1
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
−3
−2
−1
0
1
2
3
−1
0
1
2
3
515
439
256


Scale−Location
256
439
515
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Cook's distance
256
439
129
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
129
439
256
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
3
2.5
256
439
129
Cook's distance
0.00
0.01
0.02
0.03
2
1.5
1
0.5
0
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
Leverage h_{ii}
lm(formula)