


prev_injuries ~ bmi
0.815 + (0.004)*bmi


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 0.01666 on 1 and 618 Degrees of Freedom
F p−value: 0.89733
R−Squared: 3e−05
Adjusted R−Squared: −0.00159111743669205
Root MSE: 1.08373154253436
AIC: 1865.192451317



prev_injuries against bmi
prev_injuries
bmi
0
1
2
3
4
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
534
579
408
Residuals
3
2
1
0
−1
0.890
0.895
0.900
0.905
0.910
0.915
0.920
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
−3
−2
−1
0
1
2
3
−1
0
1
2
3
408579
534


Scale−Location
534
579
408
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
0.890
0.895
0.900
0.905
0.910
0.915
0.920
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
271
534
579
Cook's distance
0.00
0.01
0.02
0.03
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
3
2
1
0
−1
579
534
271
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
Cook's distance
Leverage h_{ii}
lm(formula)
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0
0.005
0.01
0.015
0
0.5
1
1.5
2
3
2.5
271
534
579