


training_load ~ bmi
3.857 + (−0.028)*bmi


A good model will have: big F−stat (at least >3 depending on n, 10+ is nice), small p−value < 0.05,
High R and Adj R,
Low AIC


F−statistic: 1.08068 on 1 and 618 Degrees of Freedom
F p−value: 0.29895
R−Squared: 0.00175
Adjusted R−Squared: 0.00013031428357646
Root MSE: 1.00378797523394
AIC: 1770.1719966371



training_load against bmi
training_load
bmi
1
2
3
4
5
20
22
24
26
28



Residuals vs Fitted
Residuals
2
1
0
−1
−2
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
584
101
474
Fitted values
lm(formula)


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(formula)
474
101
584
−3
−2
−1
0
1
2
3
−2
−1
0
1
2


Scale−Location
√|Standardized residuals|
0.0
0.5
1.0
1.5
584
101
474
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
Fitted values
lm(formula)


Cook's distance
474
507
101
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
Cook's distance
0
100
200
300
400
500
600
Obs. number
lm(formula)


Residuals vs Leverage
Standardized residuals
2
1
0
−1
−2
507
101
474
Cook's distance
0.000
0.005
0.010
0.015
Leverage
lm(formula)


Cook's dist vs Leverage* $h_{ii}/(1-h_{ii})$
Cook's distance
Leverage h_{ii}
lm(formula)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0
0.005
0.01
0.015
0
0.5
1
1.5
2
2.5
474
507
101