MODEL SUMMARY

```
Call:
glm(formula = injured ~ age + minutes_played_ths + training_load +
    prev_injuries + bmi, family = binomial(link = "logit"), data = ashford_players)

Coefficients:
                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)        −6.99993   10.18119  −0.688    0.492
age                −0.15946    0.18399  −0.867    0.386
minutes_played_ths −0.02635    0.78116  −0.034    0.973
training_load       0.40477    0.60894   0.665    0.506
prev_injuries       0.44402    0.64736   0.686    0.493
bmi                 0.33014    0.38116   0.866    0.386

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 21.983  on 24  degrees of freedom
Residual deviance: 20.189  on 19  degrees of freedom
AIC: 32.189

Number of Fisher Scoring iterations: 5
```

EXPONENTIATED COEFFICIENTS

```
       (Intercept)                 age minutes_played_ths      training_load
         0.000911943         0.852604104         0.973989471         1.498952913
      prev_injuries                 bmi
         1.558957889         1.391161469
```

EXPONENTIATED CONFIDENCE INTERVALS

```
                          2.5 %       97.5 %
(Intercept)        9.452986e-15 44628.035013
age                5.654930e-01     1.210560
minutes_played_ths 1.939257e-01     4.784287
training_load      4.134610e-01     5.540577
prev_injuries      4.202097e-01     6.764018
bmi                6.920441e-01     3.394514
                         2.5 %     97.5 %
(Intercept)        -26.9546904 12.9548242
age                 -0.5200707  0.2011508
minutes_played_ths  -1.5574038  1.5046942
training_load       -0.7887239  1.5982575
prev_injuries       -0.8247833  1.7128184
bmi                 -0.4169199  1.0771979
```

Analysis of Deviance Table

Model: binomial, link: logit

Response: injured

Terms added sequentially (first to last)

	Df	Deviance	Resid. Df	Resid. Dev	Pr(>Chi)
NULL			24	21.983	
age	1	0.45549	23	21.528	0.4997
minutes_played_ths	1	0.00348	22	21.524	0.9529
training_load	1	0.33542	21	21.189	0.5625
prev_injuries	1	0.17590	20	21.013	0.6749
bmi	1	0.82397	19	20.189	0.3640


Residuals vs Fitted
12
4
1
Pearson Residuals
3
2
1
0
−1
−3.5
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
Predicted values
glm(injured ~ age + minutes_played_ths + training_load + prev_injuries + bm ...


Q−Q Residuals
|Std. Deviance resid.|
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
4
12
1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Theoretical Quantiles
glm(injured ~ age + minutes_played_ths + training_load + prev_injuries + bm ...


Cook's Distance
4
20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Cook's distance
5
10
15
20
25
Observation