seiker

COADYUVANTES

ACEITE VEGETAL DE SOJA

Que cada gota llegue y se quede.

Mejora la emulsión, la cobertura y la adherencia del caldo, y reduce las pérdidas por evaporación y volatilización.



NATUR'L ÓLEO

Coadyuvante · Insecticida / acaricida

93%	0,5% V/V
ACEITE DE SOJA	DOSIS GENERAL

MENOS EVAPORACIÓN

MOJADO UNIFORME

ADHERENCIA Y PENETRACIÓN

01 · QUÉ ES

Un aceite vegetal que hace rendir cada aplicación.

Natur'l Óleo es un coadyuvante a base de **aceite vegetal de soja**. Mejora la emulsión del caldo, reduce las pérdidas por evaporación y volatilización y, al actuar sobre la tensión superficial de la gota, mejora la cobertura y el mojado aun en hojas con mucha pilosidad o cera. También está registrado como insecticida/acaricida.

ACEITE DE SOJA

85 g

por cada 100 cm³ · 93% p/p

DOSIS GENERAL

0,5% V/V

en todos los cultivos

Emulsionante	**c.s.p. 100 cm³**
Densidad	**0,916–0,922 g/cm³**
Clase · inflamabilidad	**IV · 3ª categoría**
Envase	**Bidón de 20 L**

02 · BENEFICIOS

MEJOR EMULSIÓN

Mejora la emulsión del caldo de aplicación.

MENOS PÉRDIDAS

Reduce las pérdidas de producto por evaporación y volatilización.

MOJADO UNIFORME

Mejor cobertura aun en hojas pilosas o cerosas.

ADHERENCIA

Mantiene el producto adherido más tiempo y favorece su penetración con lluvias o rocío.

CONTROL DE PLAGAS

Arañuela roja europea en manzano y cochinilla roja australiana en mandarina.

BIODEGRADABLE

Base vegetal fácilmente biodegradable, sin halógenos orgánicos ni metales.


> **Lo que se aplica, se queda donde tiene que estar.**

03 · CÓMO ACTÚA

La gota moja, se adhiere y penetra.

Al bajar la tensión superficial, la gota deja de rebotar o quedarse apoyada sobre pelos y ceras: se extiende sobre la hoja o el insecto, se evapora menos y el producto queda adherido más tiempo.

SIN COADYUVANTE



La gota queda **apoyada sobre pelos y ceras**, rebota o se evapora antes de actuar.

CON NATUR'L ÓLEO



Se forma una **película continua** que cubre, resiste lluvia y rocío y favorece la penetración.

Adhesivo antievaporante para **Herbicidas** **Insecticidas** **Acaricidas** **Fungicidas**

04 · CÓMO PREPARARLO

Preparación del caldo

CON PLAGUICIDA LÍQUIDO

1. Hacer una premezcla de **Natur'l Óleo (0,3–0,5%)** con el plaguicida y mezclar bien.
2. Llenar el tanque del pulverizador con agua.
3. Agregar la premezcla con el agitador en marcha.
4. Mantener la agitación durante toda la pulverización.

CON POLVO MOJABLE

1. Disolver el plaguicida en el agua justa para **formar una pasta**.
2. Agregar la dosis de Natur'l Óleo y agitar bien.
3. Volcar la mezcla al tanque con el agitador en marcha.
4. Mantener la agitación durante toda la pulverización.

⚠ NO MEZCLAR CON AZUFRE

La mezcla daña gravemente el tejido vegetal y provoca caída de hojas, flores y frutos. Solo puede combinarse durante la **dormancia**, con **1 mes de intervalo** entre ambos productos.

- Nunca durante la **floración**
- Sin viento fuerte ni **contra el viento**
- Horas frescas, mejor en **días nublados**
- Envase bien cerrado: el agua afecta la calidad

Tiempo de carencia: no posee. Usado como adhesivo, respetar la carencia del plaguicida que acompaña.

05 · DOSIS COMO COADYUVANTE

Según el plaguicida.

Dosis general: 0,5% v/v

PLAGUICIDA	NATUR'L ÓLEO	OBSERVACIÓN
Glifosato (líquido)	0,5 l/ha	Cada 3 l de glifosato
Glifosato (sólido) FG, WG, SL	0,5–0,75 l/ha	Cada 1,5 kg de glifosato
Atrazina	0,8–1,2 l/ha	Para 2 y 4 l de atrazina, respectivamente
Paraquat	0,3–0,5 l/ha	—
Graminicidas (haloxifop, cletodim, etc.)	0,5–1 l/ha	—
Acetoclor	0,5 l/ha	—
Cipermetrina	0,25 l/ha	—
Insecticidas (inhibidores de quitina)	0,25–0,5 l/ha	—
Fungicidas	0,5–1,5 l/ha	—

06 · DOSIS COMO INSECTICIDA / ACARICIDA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	CARENCIA
Manzano	Arañuela roja europea *(Panonychus ulmi)*	0,5–1 l / 100 l de agua	No tiene
Mandarina	Cochinilla roja australiana *(Aonidiella aurantii)*		

7-8 L /PLANTA

Caldo con **pistola**, según edad y tamaño

5-10 L /PLANTA

Caldo con **turboatomizador**

PUNTO DE GOTEO

Aplicar hasta el escurrimiento

COCHINILLAS: comenzar con las formas jóvenes (fines de septiembre a principios de noviembre), cuando son más fáciles de controlar. Aplicar antes de prefloración o después de la caída de pétalos: 1 o 2 aplicaciones separadas 20 días. Al eliminar las cochinillas desaparecen también la fumagina y las hormigas.

