seiker

NUTRICIÓN VEGETAL

BALANCE FUENTE / SUMIDERO

Los azúcares, directo al llenado.

Regula el crecimiento vegetativo y lleva los asimilados desde las hojas hacia tubérculos, frutos y órganos de reserva.



NITRATE BALANCER

Fertilizante líquido · Aplicación foliar

8%	0,03%
BORO (B)	MOLIBDENO (Mo)

LLENADO DE TUBÉRCULOS

MAYOR CALIBRE

MÁS RENDIMIENTO

01 · QUÉ ES

Un complejo nutricional que ordena hacia dónde van los azúcares.

Nitrate Balancer es un fertilizante líquido de aplicación foliar que **regula la actividad hormonal** y modula la relación fuente/sumidero. Frena por un tiempo el crecimiento vegetativo y facilita la máxima transferencia de azúcares desde las hojas hacia los órganos de reserva: tubérculos, frutos, yemas y madera.

BORO (B)	MOLIBDENO (MO)	
8%	0,03%	
acomplejado · p/v	acomplejado · p/v	
		Complejante **aminas y ác. carboxílicos**
		pH **7,5**
		Densidad (20 °C) **1,3 g/ml**
		Solubilidad (20 °C) **100%**

02 · BENEFICIOS

LLENADO
Estimula el llenado de tubérculos en la fase final del ciclo.

CALIBRE
Mejora el tamaño de los tubérculos.

RENDIMIENTO
Más azúcares en el órgano que se cosecha, más kilos por hectárea.

MÁS RESERVAS
Aumenta las reservas de los frutales de hoja caduca antes del receso.

LIGNIFICACIÓN
Acelera la lignificación y frena el crecimiento vegetativo.

YEMAS FÉRTILES
Mejora la fertilidad de las yemas futuras y favorece la brotación.


> **Lo que la hoja produce, que llegue a la cosecha.**

03 · CÓMO ACTÚA

De la hoja al órgano de reserva.


Las hojas son la **fuente** de azúcares; tubérculos, frutos, yemas y madera son los **sumideros**. Nitrate Balancer inclina ese balance hacia el sumidero que se cosecha.

SIN BALANCE



La planta sigue **armando hojas y tallos**: los azúcares se quedan arriba y el órgano de reserva llena menos.

CON NITRATE BALANCER



Freno vegetativo **temporario**: los asimilados bajan al tubérculo, al fruto o a la madera.

Nutrientes acomplejados. Boro y molibdeno van rodeados por un agente complejante (aminas primarias y ácidos carboxílicos) que evita que formen compuestos insolubles en el caldo o en el suelo. Así la absorción se acerca al 100%.

04 · CUÁNDO APLICAR

Momentos clave

Papa
1,5–2 · 2–4 · 4–5 l/ha

Plantación · **Tuberización plena** · **Pleno llenado** · **1 mes antes de madurez** · Cosecha

Papa · Bs. As. Sur
2–4 · 2–4 · 4–5 l/ha

Tuberización · **Pleno llenado** · **+10 días** · **1 mes antes de madurez** · Cosecha

Maní
1–2 l/ha

R1 · R3 · **R5** · R7 · R8

Frutales de hoja caduca
4–6 l/ha · pera y manzana 6 l/ha

Floración · Cosecha · **Poscosecha** · **Abril: inicio de senescencia** · Caída de hojas

Antes de mezclar con otros productos, hacer una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física. Consulte a su ingeniero agrónomo.

05 · GUÍA DE APLICACIÓN

Dosis por cultivo.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
EXTENSIVOS Y HORTÍCOLAS		
Papa	1,5–2 / 2–4 / 4–5 l/ha	3 aplicaciones: tuberización plena / pleno llenado / 1 mes antes de madurez
Papa · Bs. As. Sur	2–4 / 2–4 / 4–5 l/ha	3 aplicaciones: pleno llenado / 10 días después / 1 mes antes de madurez
Maní	1–2 l/ha	En R5
Maíz	1,5 l/ha	En R3
Cebolla (Cuyo)	5 l/ha	30 días antes de cosecha
FRUTALES		
Pera · Manzana	6 l/ha	Poscosecha
Vid	5 l/ha	Poscosecha, con 5–10% de hojas amarillas
Frutales de hoja caduca*	4–6 l/ha	Desde la 1ª quincena de abril, cuando baja la temperatura, se acorta el fotoperíodo y las hojas empiezan a amarillear. Repetir cada 15 días, hasta 3 aplicaciones
Frutilla	2–4 l/ha	Para controlar el exceso de vigor; repetir cada 15 días si es necesario
Palto	4–5 l/ha	En floración

*Almendro, arándano, avellano europeo, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, nectarín, nogal, peral, plantaciones nuevas y viveros, vid de mesa y vinífera.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Hacer siempre una prueba de mezcla: el orden de carga depende de los productos, sus formulaciones y su pH.

ALMACENAMIENTO

En su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. Evitar el contacto directo con el suelo y otros productos.

METALES PESADOS

Arsénico 17,4 mg/kg · plomo, cadmio y mercurio < 0,5 mg/kg (límite analítico 0,5 mg/kg).

