seiker

SOLUCIONES NUTRICIONALES

MICRONUTRIENTES FOLIARES

El arranque que tu cultivo necesita.

Zinc, manganeso, cobre y boro quelatados, de rápida absorción, para más macollaje, sanidad y rendimiento.



STARTER PLUS

Fertilizante líquido · Aplicación foliar

5%	3%	0,5%	0,5%
ZINC	MANG.	COBRE	BORO

ZINC RÁPIDAMENTE DISPONIBLE

MACOLLAJE Y SANIDAD

POTENCIA EL NITRÓGENO

01 · QUÉ ES

Cuatro micronutrientes en equilibrio, en una sola aplicación.

Starter Plus es un fertilizante líquido de aplicación foliar que suministra **zinc, manganeso, cobre y boro** de forma equilibrada. Se absorbe rápidamente por hojas, tallos y demás tejidos verdes, y la fracción que llega al suelo puede ser aprovechada por las raíces.

ZINC · ZN	MANGANESO · MN	COBRE · CU	BORO · B
5%	3%	0,5%	0,5%
≈ 65 g/L	≈ 39 g/L	≈ 6,5 g/L	≈ 6,5 g/L

Formulación **Líquido, quelatado** Densidad **1,3 g/ml** pH **7,9** Aplicación **Foliar · semilla · fertirriego**
Envase **Bidón 5 L**

02 · BENEFICIOS

ZINC DISPONIBLE
Aporta zinc rápidamente disponible para la planta.

EQUILIBRIO
Suministra micronutrientes de forma equilibrada.

MACOLLAJE
Favorece el macollaje y la sanidad del cultivo.

MÁS NITRÓGENO
Complementa y potencia la fertilización nitrogenada.

RENDIMIENTO
Contribuye al logro de altos rendimientos.

HOJAS ACTIVAS
Hojas más verdes y fotosintéticamente activas.

DESARROLLO
Favorece el desarrollo vegetativo de la planta.

BALANCE
Ayuda al balance nutricional del cultivo.

> **Micronutrientes protegidos, absorción cercana al 100%.**

03 · CÓMO ACTÚA

El poder de la quelatación.


Un quelato es un compuesto en el que una molécula orgánica (el agente quelante) rodea y se enlaza al ion metálico, protegiéndolo de reacciones indeseadas con el medio.

MICRONUTRIENTE SIN PROTEGER



El ion libre reacciona en el caldo de aplicación o en el suelo y forma **compuestos insolubles** que la planta no puede absorber.

MICRONUTRIENTE QUELATADO · STARTER PLUS




El agente quelante protege al nutriente hasta que llega a la hoja: la **eficiencia de absorción es cercana al 100%**.

*Antes de mezclar con otros productos, realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física.

04 · CUÁNDO APLICAR

Momentos clave en extensivos



05 · GUÍA DE APLICACIÓN

Dosis por cultivo.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
CULTIVOS EXTENSIVOS		
Maíz	3–4 l/ha	Aplicación entre V3 y V5
Trigo · Cebada · Avena	2–4 l/ha	1 a 2 aplicaciones durante el macollaje
Arroz	1–1,5 l/100 kg	Tratamiento a la semilla
Arroz	2–4 l/ha	1 a 2 aplicaciones durante el macollaje
Soja	3 l/ha	1 a 2 aplicaciones a los 20 y 45 días post emergencia
Poroto · Arveja · Lenteja	2–3 l/ha	1 a 2 aplicaciones desde los 20–25 días post emergencia
Papa	2–4 l/ha	Desde tuberización en adelante, según requerimiento
FRUTALES Y HORTÍCOLAS		
Frutales en general	3–5 l/ha	4 aplic./año: brotación, prefloración, post cuaje y post cosecha
Olivo	3–5 l/ha	4 aplic./año: inicio de floración, crecimiento de fruto y post cosecha
Nogal (plantas jóvenes)	350 ml/100 l agua	3 aplicaciones c/15 días en etapas de máximo crecimiento
Nogal (adultas)	3–5 l/ha	Yema hinchada, formación de racimos y/o correctivas
Hortalizas en general	300 ml/100 l agua	4 aplic. c/7 días, desde la 1ª aplicación de defensivos
Ajo · Cebolla	300 ml/100 l agua	4 aplic. c/7 días, desde la 1ª aplicación de defensivos

PREPARACIÓN

Orden de carga: 1 · agua, 2 · **Starter Plus**, 3 · agroquímicos + Natur'l Óleo. En fertirriego, diluir en no más del 50% del volumen final y aplicar en el último tercio del riego.

IMPORTANTE

Complementa, no reemplaza, la fertilización al suelo. Para mejor mojado, sumar un tensioactivo no iónico al 0,5–1%. No aplicar con calor extremo. No exceder las dosis. Probar compatibilidad antes de mezclar.

