

#### T P 04 Ej. 24-ii

En los siguientes ítems, se da la ecuación de una superficie S y un vector  $N \in \mathbf{R}^3$ . Determinar los puntos de S para los que N es un vector Normal a S:

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \quad N = (-2, 3, 6)$$

Para resolver este ejercicio primero debemos entender algo; en geometría, un vector normal a una cantidad geométrica (línea, curva, superficie, etc) es un vector de un espacio con producto escalar que contiene tanto a la entidad geométrica como al vector normal. Este vector tiene la propiedad de ser ortogonal a todos los vectores tangentes a la entidad geométrica.

En el caso tridimensional, una superficie normal a un punto P es un vector que es perpendicular al plano tangente a esa superficie en P. La herramienta que utilizamos para obtener a este vector normal es el Vector Gradiente.

El vector gradiente tiene la siguiente forma:

$$\nabla f(P) = \left( \frac{\partial f(P)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(P)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(P)}{\partial x_n} \right)$$

Donde cada componente del vector es la derivada parcial para cada una de las variables que tiene la función original.

Una vez que obtuvimos el vector Normal a la superficie S, lo que tenemos que hacer es observar si dicho vector es Colineal al vector N dado en el enunciado. Un Vector Colineal a otro tiene la siguiente particularidad: Se trata de aquellos vectores que aparecen en la misma recta o que resultan paralelos a una cierta recta.

En nuestro caso nos interesan los que están sobre la misma recta. Para saber si el Vector Normal de la superficie S es Colineal a N debemos realizar la siguiente cuenta:

$$\nabla f(P) = \lambda N \text{ donde } \lambda \text{ es un escalar que permite diferenciar la intensidad entre los vectores.}$$

Entonces en nuestro ejercicio obtendríamos el siguiente Sistema de ecuaciones:

$$\left( \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}, \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}, \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial z} \right) = \lambda(-2, 3, 6)$$

Resolviendo las derivadas y distribuyendo lambda obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones igualando componente a componente:

$$\begin{cases} 2x = -\lambda 2 \\ 4y = \lambda 3 \\ 6z = \lambda 6 \end{cases}$$

Donde  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ , ya que si no ponemos esta condición en el sistema, tendríamos un sistema incompatible.

Operando y simplificando obtenemos:

$$\begin{aligned} x &= -\lambda \\ y &= \lambda 3/4 \\ z &= \lambda \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función  $f$  obtenemos:

$$(-\lambda)^2 + 2(3/4 \cdot \lambda)^2 + 3\lambda^2 = 1 \text{ Sumando obtenemos}$$

$$41/8\lambda^2 = 1 \text{ Resolviendo obtenemos}$$

$$\lambda^2 = 8/41 \text{ Resolviendo obtenemos}$$

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{8}{41}}, \lambda_2 = -\sqrt{\frac{8}{41}}$$

Una vez que obtuvimos los lambdas que resuelven el Sistema, reemplazamos en la equivalencia para obtener el punto donde N es Normal a S.

$$P_1 = \left( -\sqrt{\frac{8}{41}}; \frac{3}{4}\sqrt{\frac{8}{41}}; \sqrt{\frac{8}{41}} \right) \text{ y } P_2 = \left( \sqrt{\frac{8}{41}}; -\frac{3}{4}\sqrt{\frac{8}{41}}; -\sqrt{\frac{8}{41}} \right).$$

Sobre ambos dos puntos el vector gradiente y N son colineales; pero N coincide en el cuadrante con  $P_1$ , por lo tanto el punto que resuelve el enunciado es  $P_1$ .